

**DIE PROLAKTIN-, HCG- UND HPL-SEKRETION
IN DER NORMAL-SCHWANGERSCHAFT
UND IN 9 SCHWANGERSCHAFTEN NACH
HYPERPROLAKTINÄMISCHER AMENORRHOE**

Johann Huber

1978



Digitized by the Internet Archive
in 2026

AUS DER I. FRAUENKLINIK DER UNIVERSITÄT
MÜNCHEN

Direktor : Prof. Dr. J. Zander

DIE PROLAKTIN-, HCG- und HPL-SEKRETION IN DER NORMAL-
SCHWANGERSCHAFT UND IN 9 SCHWANGERSCHAFTEN NACH
HYPERPROLAKTINÄMISCHER AMENORRHOE

Inaugural-Dissertation

zur Erlangung der Doktorwürde in der gesamten Medizin
verfaßt und einer Hohen Medizinischen Fakultät
der Ludwig-Maximilians-Universität München

vorgelegt von
Johann Huber
aus München

München 1978

Gedruckt mit Genehmigung der
Medizinischen Fakultät der Universität München

1. Berichterstatter : Prof. Dr. K. Holzmann
2. Berichterstatter : Prof. Dr. J. Zander

Dekan : Prof. Dr. W. Spann

Tag der mündlichen Prüfung : 28.11.1978



In Dankbarkeit meinen Eltern
und meiner Großmutter gewidmet.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. ZIEL- UND PROBLEMSTELLUNG	1
2. ALLGEMEINER TEIL	3
2.1 Chemie und Physiologie des Prolaktins (hPRL)	3
2.2 Therapie der hyperprolaktinämischen Amenorrhoe mit CB 154 - Fa. Sandoz	4
2.3 Chemie und Physiologie von human chorionic gonadotropin (HCG)	5
2.4 Chemie und Physiologie von human placental lactogen (HPL)	6
3. PATIENTINNEN UND METHODEN	
3.1 Patientinnen	7
3.1.1 Kontrollgruppe der Normalschwanger-schaften	7
3.1.2 Patientinnen nach behandelter hyperprolak-tinämischer Amenorrhoe	8
3.1.3 Blutentnahme	10
3.2 Methode	
3.2.1 Einführung	11
3.2.2 Grundlagen des Radioimmunassays (RIA)	11
3.3 Hormonbestimmungen	
3.3.1 Markierung von HCG- β -subunit	13
3.3.1.1 Sephadex-(G 50)-Säule	13

	Seite
3.3.1.2	Pufferlösungen zur Markierung 13
3.3.1.3	Reagentien zur Markierung 14
3.3.1.4	Markierung 14
3.3.2	Durchführung des RIA für HCG- β
3.3.2.1	Pufferlösungen und Einzelreagentien 16
3.3.2.2	Ansatzschema des HCG- β -RIA 17
3.3.2.3	Sensitivität, Spezifität und Richtigkeit 17
3.3.2.4	Berechnung der Hormonkonzentrationen 19
3.3.2.4.1	O- und T-Wert 19
3.3.2.4.2	Mathematische Auswertung 19
3.3.3	human prolactin (hPRL)
3.3.3.1	Ansatzschema des hPRL-RIA 20
3.3.3.2	hPRL-Standardkurve (MRC 71/222) 21
3.3.4	human placental lactogen (HPL) 22
3.3.4.1	Bereitung der Reagentien 22
3.3.4.2	Ansatzschema des HPL-RIA 22
3.3.4.3	Sensitivität und Kreuzreaktivität 22
4.	ERGEBNISSE
4.1	Mittelwert und 95 %-Vertrauensbereich der Serumkonzentrationen von hPRL, HCG und HPL in der Normalschwangerschaft und post partum
4.1.1	human placental lactogen (HPL)
4.1.1.1	HPL während der Schwangerschaft 23
4.1.1.2	HPL post partum 24
4.1.2	human chorionic gonadotropin (HCG)
4.1.2.1	HCG während der Schwangerschaft 25
4.1.2.2	HCG post partum 27

	Seite
4.1.3	human prolactin (hPRL)
4.1.3.1	hPRL in der Schwangerschaft 27
4.1.3.2	hPRL post partum 29
4.2	Verläufe der Serumkonzentrationen von HPL, HCG und hPRL während der Schwangerschaft und post partum bei normoprolaktinämischen Patientinnen (N=10)
4.2.1	HPL-Verlauf während der Schwangerschaft und post partum 29
4.2.2	HCG-Verlauf während der Schwangerschaft und post partum 30
4.2.3	hPRL-Verlauf während der Schwangerschaft und post partum 30
4.2.4	Graphische Darstellung der Verläufe von HPL, HCG und hPRL während der Normal- schwangerschaft und post partum (N=10) 32
4.3	Verläufe der Serumkonzentrationen von HPL, HCG und hPRL während der Schwanger- schaft und post partum bei 9 Patientinnen nach behandelter hyperprolaktinämischer Amenorrhoe
4.3.1	HPL-Verlauf während der Schwangerschaft und post partum 37
4.3.2	HCG-Verlauf während der Schwangerschaft und post partum 38
4.3.3	hPRL-Verlauf während der Schwangerschaft und post partum 38
4.3.4	Graphische Darstellung der Verläufe von HPL, HCG und hPRL während der Schwanger- schaft (N=8) und post partum (N=9) 40

		Seite
4.4	Schwangerschaftsverlauf der Patientinnen aus beiden Vergleichsgruppen	46
4.4.1	Gruppe der Normalschwangerschaften	46
4.4.2	CB 154-Gruppe	46
4.4.3	Ergebnis	47
4.5	Vergleichende Betrachtung der Geburtsdaten in beiden Patientinnengruppen	47
5.	DISKUSSION DER ERGEBNISSE	49
6.	ZUSAMMENFASSUNG	57
7.	ANHANG MIT WERTETABELLEN I - XII	59
8.	LITERATURVERZEICHNIS	77

Verzeichnis der verwendeten Abkürzungen

AK	=	Antikörper
ap	=	ante partum
cpm	=	counts per minute
CB 154	=	2-Br- α -Ergocriptin (Pravidel ^R)
FSH	=	follicle stimulating hormone
h	=	Stunde
HCG	=	human chorionic gonadotropin
HPL	=	human placental lactogen
hPRL	=	human prolactin
hPRL-IF	=	-inhibiting factor
hPRL-RF	=	-releasing factor
HVL	=	Hypophysen-Vorderlappen
IE	=	Internationale Einheit
KG	=	Körpergewicht
LH	=	luteinizing hormone
M	=	Mol, molar
N	=	Fallzahl
pp	=	post partum
s	=	Standardabweichung
SSW	=	Schwangerschaftswoche
STH	=	somatotropin hormone
$\bar{x}$	=	Mittelwert
VK	=	Variationskoeffizient

1. . ZIEL - UND PROBLEMSTELLUNG

Erhöhte Prolaktinkonzentrationen im Serum nichtschwangerer Frauen können eine Amenorrhoe verursachen, wobei die Galaktorrhoe in diesem Zusammenhang kein obligates Symptom darstellt.

Die pathophysiologische Grundlage dieser Störung des hypothalamisch-hypophysär-ovariellen Regelkreises ist zur Zeit noch unklar.

Einerseits existieren Hinweise für eine direkte Hemmwirkung von Prolaktin auf die Ovarien (BESSER 3, 4), während andererseits mehrere Autoren einen hypothalamischen Angriffspunkt von Prolaktin auf den Sekretionsmechanismus der Gonadotropine für wahrscheinlich halten (BOHNET, 6; BOYAR, 7; RJOSK, 52).

Unabhängig von der Ätiologie solcher Störungen kann man die Prolaktinsekretion durch 2-Brom-alpha-Ergocriptin (Versuchsbezeichnung CB 154, Fa. Sandoz) hemmen und damit eine reguläre Gonadotropinsekretion mit nachfolgenden ovulatorischen Zyklen induzieren. Gleichzeitig wird eine begleitende Galaktorrhoe beseitigt oder zumindest gebessert.

Von verschiedenen Autoren ist der Eintritt einer Schwangerschaft unter der Behandlung der hyperprolaktinämischen Amenorrhoe beschrieben worden. Über die Prolaktinsekretion in der CB 154-induzierten Gravidität liegen bisher keine Publikationen vor. Weiterhin bleibt offen, ob solche Patientinnen durch eine Schwangerschaft besonders gefährdet sind, wenn der Zyklusstörung ein sogenanntes prolaktinbildendes Hypophysenadenom (Prolaktinom)

zugrunde liegt.

Ziel der vorliegenden Arbeit war es:

1. 2-s-Normbereiche für die Prolaktin-, HCG- und HPL-Serumkonzentrationen in der physiologischen Gravidität zu definieren,
2. den Einfluß einer Schwangerschaft auf die bestehende pathologische Prolaktinsekretion zu untersuchen,
3. eine durch ggf. veränderte Prolaktinkonzentrationen mögliche Beeinflussung der plazentaren HCG- und HPL-Produktion während der Schwangerschaft und post partum zu zeigen,
4. den klinischen Verlauf dieser Schwangerschaften zu beschreiben.

2. ALLGEMEINER TEIL

2.1 Chemie und Physiologie des PROLAKTINS (hPRL)

Prolaktin ist ein einkettiges Proteohormon, aufgebaut von etwa 190 Aminosäuren und 2 oder 3 Disulfidbrücken. Sein Molekulargewicht liegt bei 21 000 (NIALL, 47).

Prolaktin wird von den laktotropen Zellen des Hypophysenvorderlappens (HVL) sezerniert (30) und steht ebenso wie die anderen Hypophysenhormone unter der Kontrolle übergeordneter hypothalamischer Zentren.

hPRL-Releasing-Factor (-RF) und hPRL-Inhibitory-Factor (-IF), deren Struktur noch unbekannt ist, gelangen über den hypophysären Pfortaderkreislauf in die prolaktinproduzierenden Zellen des HVL und regulieren die hPRL-Sekretion.


Prolaktin besitzt nach heutigen Erkenntnissen biologische Bedeutung für die Mammo- und Laktogenese, sowie die Galaktopoese post partum (FRIESEN, 23; PORTER, 50; TURKINGTON, 62; TYSON, 64). Inwieweit Wirkungen auf den Salz-Wasser-Haushalt und Stimulation anderer Hormone existieren, ist ungeklärt.

Mit dem Wachstumshormon HGH besteht immunologische Ähnlichkeit und erst die Entwicklung eines spezifischen RIA durch HWANG (35) und LEWIS (42) ermöglicht seit 1971 den quantitativen Nachweis von Prolaktin im Serum.

2.2 Therapie der hyperprolaktinämischen Amenorrhoe mit CB 154

Der genaue Pathomechanismus der hyperprolaktinämischen Amenorrhoe ist noch ungeklärt (RJOSK, 52). 2-Brom- α -Ergocriptin (Versuchsbezeichnung CB 154, Fa. Sandoz) hemmt die hPRL-Sekretion im HVL. (FLÜCKIGER, 19) Erhöhte HGH-Spiegel werden ebenfalls gesenkt (66). Mit ausreichender Dosierung wird bei Hyperprolaktinämie die Normalisierung der Prolaktinsekretion erreicht.

In der Regel treten wieder ovulatorische Zyklen auf.



Bei positivem Schwangerschaftstest muß wegen fehlender Informationen über eventuelle teratogene Einflüsse CB 154 sofort abgesetzt werden.

2.3 . Chemie und Physiologie von HUMAN CHORIONIC GONADOTROPIN (HCG)

Human chorionic gonadotropin setzt sich als Glykoproteid aus Aminosäuren und einem Kohlenhydratanteil von etwa 30 % zusammen. Seine Produktion in der Plazenta ist nach SAXENA (55) anfangs im Zytotrophoblasten und später im Synzytiotrophoblasten anzunehmen. Das Hormon ist von α - und β -Untereinheiten (subunits) aufgebaut und sein Molekulargewicht liegt nach CANFIELD (13) bei 46 000.

Chemische Struktur und biologische Wirkung ähneln sehr dem LH und erklären damit auch dessen immunologische Verwandtschaft.

Die physiologische Bedeutung von HCG während der ersten Schwangerschaftswochen ist in der Erhaltung des corpus luteum zu sehen, das die Oestrogen- und Progesteronbildung aufrechterhält und das Eintreten der Menstruationsblutung verhindert. Weitere Wirkungen sind wahrscheinlich die Beeinflussung der fetalen Gonadendifferenzierung und der Steroidproduktion in der fetalen Nebennierenrinde. Die direkte Stimulation von Interstitiumzellen in Hoden und Ovar scheint gesichert (BRODY, 10). Nicht gelöst wurde bisher die Frage nach dem Regulationsmechanismus der HCG-Synthese.

Mit der sehr empfindlichen und spezifischen Methode der radioimmunologischen Bestimmung der HCG- β -Untereinheit gelingt der HCG-Nachweis bereits am 8. Tag post conceptionem. Während der ersten 12 Schwangerschaftswochen kommt es zu einem steilen Anstieg der Serumkonzentration, gefolgt von einem Abfall bis zur 20. SSW.

2.4 Chemie und Physiologie von HUMAN PLACENTAL LACTOGEN (HPL)

Im Jahre 1961 isolierten ITO und HIGASHI erstmals HPL aus der menschlichen Plazenta (36). JOSIMOVICH und MC LAREN (39) bestätigten 1962 den plazentaren Ursprung des Hormons. Im Synzytiotrophoblasten, der Bildungsstätte des Hormons, werden in der Spätschwangerschaft 1 - 2 g HPL/die synthetisiert (22). Somit ist HPL das mengenmäßig bedeutendste Hormon während des letzten Drittels der Schwangerschaft.

190 Aminosäuren mit 2 innermolekularen Disulfidbrücken bilden eine Polypeptidkette mit einem Molekulargewicht von 21 600 (LI, 44).

Die physiologische Bedeutung des Hormons ist noch unklar. Jedoch ist ein Einfluß auf die Stoffwechselfunktionen der Schwangeren wahrscheinlich. Im Tierversuch konnten Wirkungen auf Wachstum, Mammaentwicklung, Galaktopoesis und Gelbkörperbildung nachgewiesen werden (55). Die Übertragbarkeit dieser Befunde auf den Menschen muß noch bewiesen werden. Ähnlich wie HGH besitzt HPL anabole, lipolytische und insulinogene Eigenschaften (54, 55, 59, 60).

HPL ist ab der 7. SSW im Serum nachweisbar. Die Konzentrationen steigen während der Schwangerschaft kontinuierlich an und erreichen ab der 36. SSW Werte zwischen 4 - 8 μ g/ml.

3. PATIENTINNEN UND METHODE

3.1 Patientinnen

In der Ambulanz der I. Univ.-Frauenklinik München wurden im Zeitraum von April 1975 bis März 1977 bei 330 schwangeren Patientinnen der 5. - 42. SSW Blutproben entnommen. Bedingung war, daß die Schwangerschaften in endokrinologischer und klinischer Hinsicht normal verliefen und die Blutentnahme mit ausdrücklichem Einverständnis der Patientin erfolgen konnte. Von diesen Patientinnen wurden die Serumkonzentrationen an hPRL, HPL und HCG bestimmt.

9 Patientinnen nach Behandlung einer hyperprolaktinämischen Amenorrhoe wurden in gleicher Weise untersucht.

3.1.1 Kontrollgruppe der Normalschwangerschaften

Zur Ermittlung normaler longitudinaler Hormonverläufe während der gesamten Schwangerschaft, stellten sich die in Tabelle 1 aufgeführten Patientinnen zur Verfügung. Sie bilden somit das Kontrollkollektiv, das mit der Gruppe der Patientinnen, die nach Behandlung einer hyperprolaktinämischen Amenorrhoe mit CB 154 schwanger geworden waren, verglichen wurde.

Die Blutentnahme erfolgte in 14-tägigen Abständen.

Tabelle 1

Anamnestische Daten der Patientinnen aus der Vergleichsgruppe der Normalschwangerschaften

Name	Alter (Jahre)	Para	Menarche (Jahre)	Cyclus (Tage)	Blutung (Tage)
B. H.	30	I	14	28	5
B. T.	29	I	13	35	7
C. L.	25	I	14	30	5
H. C.	24	II	12	28-34	3-5
H. R.	33	II	15	26	4-5
H. W.	30	I	13	24	5
K. B.	29	II	15	27-29	5
K. H.	32	I	14	28-30	5
P. B.	30	IV	15	27-29	5
S. E.	37	I	10	28-30	3-5

Im Hinblick auf das Alter der hyperprolaktinämischen Patientinnen mit Kinderwunsch, häufig über 30 Jahre, war versucht worden, für die Gruppe der Normalschwangerschaften bevorzugt Probandinnen in derselben Altersstufe zu gewinnen.

3.1.2 Patientinnen nach behandelter hyperprolaktinämischer Amenorrhoe

Bei 9 Patientinnen kam es nach unterschiedlich langer Prolaktin-suppression mit CB 154 zur Konzeption (RJOSK, 52). Nach Feststellung der Schwangerschaft (positiver HCG-Befund) wurde CB 154 sofort abgesetzt. Die Patientinnen kamen ab diesem Zeitpunkt regelmäßig alle 14 Tage zur klinischen und endokrinologischen Untersuchung in die Klinik.

Tabelle 2 zeigt die anamnestischen Daten der Patientinnen sowie die hPRL-Konzentrationen vor der Behandlung mit CB 154.

Tabelle 2

Anamnestiche Daten der Patientinnen mit hyperprolaktinämischer Amenorrhoe

Anzahl der Geburten, Pubarche, Dauer der Amenorrhoe, Galaktorrhoe, hPRL-Serum-Konzentrationen vor CB 154-Applikation, radiologischer sella turcica - Befund (N = normale sella, V = vergrößerte sella turcica)

Name	Alter (Jahre)	Para	Pubarche (Alter)	Dauer der Amenorrhoe (Jahre)	Galak- torrhoe	hPRL (μ E/ml)	sella turcica
G. T.	29	I	14	1	+	980	N
H. M.	27	I	12	4	+	2 410	N
K. B.	33	I	13	3	-	12 630	V
M. E.	25	I	11	1	+	3 500	V
M. I.	36	II	13	8	+	2 000	N
N. M.	31	I	14	11	+	1 890	N
P. B.	25	I	12	5	+	2 960	V
R. M.	40	I	17	14	+	1 140	N
S. E.	38	II	12	2	+	1 200	N

3.1.3 Blutentnahme

Normalerweise wurden aus einer Armvene 6 ml Nativblut entnommen, nach 1 Stunde zentrifugiert, das Serum in Plastikröhrchen einpipettiert und bei -20°C eingefroren. Die Blutabnahmen waren nicht an eine bestimmte Tageszeit gebunden, da weder HPL noch HCG auffällige zirkadiane Konzentrationsunterschiede zeigen (49, 27). BOYAR (8) beschreibt eine erhöhte hPRL-Sekretion während der Schlafphasen. 1 Stunde nach Schlafende haben sich die hPRL-Konzentrationen wieder auf das normale Tagesniveau eingependelt.

Während vaginaler Geburten oder notwendiger sectiones caesareae wurden nach einem festen Zeitplan Blutproben aus Braun'schen Flügelkanülen aspiriert.

Zeitplan: 1^{h} ap - partus - $10'$ - 1^{h} - 4^{h} - 24^{h} pp

Allerdings mußten bei jeder Blutentnahme die ersten 2 ml Mischblut (Infusionslösung + Venenblut) verworfen werden.

Aus der an beiden offenen Enden mit Klemmen gesicherten Nabelschnur erfolgte die getrennte Entnahme von Arterien- und Venenblut. Im Wochenbett konnte in zweitägigem Abstand Blut wieder direkt aus der Armvene gewonnen werden.

3.2 Methode

3.2.1 Einführung

Die radioimmunologische Bestimmung von Proteohormonen beruht im Prinzip auf der 1960 von YALOW und BERSON (68) zur Insulinbestimmung im Blut entwickelten Methode, in der die hohe Spezifität immunologischer Methoden mit der großen Empfindlichkeit radiochemischer Arbeitsweisen kombiniert wurde.

Auf diese Weise können Hormone mit Serumkonzentrationen im Nano- bzw. Picogrammbereich quantitativ bestimmt werden.

3.2.2 Grundlagen des Radioimmunassay (RIA)

Im RIA wird die Bindung des zu messenden Antigens an einen spezifischen Antikörper durch die Anwesenheit von radioaktiv markiertem Antigen ("Tracer") kompetitiv gehemmt. Nach dem Massenwirkungsgesetz verringern dabei steigende Konzentrationen unmarkierten Antigens den Anteil des am spezifischen Antikörper gebundenen Tracers. Voraussetzung dafür ist ein gleichartiges Verhalten von markiertem und unmarkiertem Antigen gegenüber dem Antikörper. Aufgrund seiner hohen Affinität zu Tyrosin läßt sich ^{125}J zur radioaktiven Markierung leicht in ein Proteinmolekül einbauen. Es eignet sich damit hervorragend zur Herstellung des "Tracers" (GREENWOOD, 28). Ein spezifischer Antikörper kann z.B. durch Sensibilisierung von Kaninchen mit dem menschlichen Antigen gewonnen werden (JAFJE und BEHRMANN, 38). Zur Trennung von antikörpergebundenem und freiem Hormon wird in der Hormonanalytik die sogenannte "Doppelantikörpermethode"

(HALES, 29; MORGAN, 46) bevorzugt angewandt. Nach Zugabe des spezifischen 1. Antikörpers und des unspezifischen 2. Antikörpers kommt es zur Bildung eines Hormon-AK 1-AK 2-Komplexes, der durch Zentrifugation abgetrennt wird. Die im Präzipitat nach Abdekantieren des Überstandes verbliebene Radioaktivität wird mit einem γ -Zähler gemessen.


Eine vertiefende Einführung in die Methode des RIA geben JAFFE und BEHRMANN (38).

Die eingesetzten Substanzen sowie die praktische Durchführung des RIA werden am Beispiel des HCG- β -Radioimmunassay im einzelnen beschrieben.

Das Prinzip des RIA ist in Abbildung 2 graphisch dargestellt.

Abbildung 2: Prinzip des RIA ("Doppelantikörpermethode")

DOPPELANTIKÖRPERMETHODE



3.3 . HORMONBESTIMMUNGEN

Die Bestimmung von hPRL, HCG und HPL erfolgte radioimmuno-
logisch nach der Doppelantikörpermethode. Am Beispiel des HCG-
β-RIA wird die praktische Durchführung im einzelnen beschrieben.

3.3.1 Markierung von HCG-β-subunit

Zur Herstellung des Tracers wurden folgende Materialien verwen-
det:

3.3.1.1 Sephadex-(G 50)-Säule

2 g Sephadex-G 50 (Fa. PHARMACIA, Uppsala, Schweden) wurden
mit 30 ml 0.07 M-Veronalpuffer versetzt. Nach 2 bis 3 Stunden
wurde die gelartige Lösung in eine sorgfältig gereinigte Glassäule
eingefüllt. Die Säule wurde mit 1 ml 0.07 M-Veronalpuffer, wo-
rin 30 mg Albumin gelöst waren, gesättigt. Vor Gebrauch wurde
die Säule mit 20 ml 0.07 M-Veronalpuffer nachgewaschen.

3.3.1.2 Pufferlösungen zur Markierung

Phosphatpuffer nach Sörensen (0.5M)

Lösung A: 6.81 g KH_2PO_4 in 100 ml dest. H_2O

Lösung B: 44.50 g $\text{Na}_2\text{HPO}_4 \cdot 2 \text{H}_2\text{O}$ in 500 ml dest. H_2O

Unter laufender Kontrolle mit dem pH-Meter wird solange Lösung
A zur Lösung B gegeben, bis ein pH von 7.5 erreicht ist.

Phosphatpuffer (0.5 M) mit 2 % Rinderalbumin

In oben bereitetem Puffer wird die berechnete Menge Rinderalbumin (Behringwerke) gelöst.

Natrium-Veronal-Puffer

0.1 M : 20.6 g Na-Veronal in 1 000 ml dest. H₂O

0.07 M : 350 ml 0.1 M-Veronalpuffer + 150 ml dest. H₂O

3.3.1.3 Reagentien zur Markierung

- a) Na-¹²⁵J der Firma Hoechst (2 mCi)
- b) 100 mg Cloramin-Trihydrat (Merck) in 10 ml Phosphatpuffer (0.05 M)
- c) 100 mg Natriumdisulfid (Merck) in 10 ml Phosphatpuffer (0.05 M)
- d) 50 µg lyophilisiertes HCG-β (Serono) in 0.1 ml Phosphatpuffer (0.01 M)
- e) 20 mg Rinderalbumin (Behringwerke) in 1.0 ml Phosphatpuffer (0.05 M)

3.3.1.4 Markierung

In ein konisches Eppendorf-Reaktionsgefäß werden folgende Lösungen einpipettiert:

20	µl der HCG-β-Lösung
20	µl der Chloramin-T-Lösung
200	µl einer 2 %-igen Albuminlösung
2	mCi Na- ¹²⁵ J in 20 µl 0.01 M-Phosphatpuffer
50	µl der Natriumdisulfidlösung


Zwischen der Zugabe von Chloramin-T und Na-Disulfid liegt die exakt gestoppte Reaktionszeit von 1 Minute.

Der vollständige Inhalt des Reaktionsgefäßes wird mit einer Glas-kapillare auf die vorbereitete Sephadex-G 50-Säule aufgebracht und nach vollständiger Resorption mit 20 ml 0.07 M-Veronalpuffer nachgespült. Bereits vorher wurde die Säule mit Albumin abgesättigt (siehe 3.3.1.2). Hierdurch soll die Jodierung des Sephadex-G 50 vermieden werden. An der Säule erfolgt die Trennung des markierten Hormons von den freien Jodid-Ionen. Das Eluat wird in Fraktionen zu 1 ml - Portionen aufgefangen. In das 8. bis 12. Röhrchen wird je 1 ml einer 5 %-igen Rinderalbuminlösung einpipettiert, da hier erfahrungsgemäß der Aktivitätsgipfel des markierten Hormons gemessen wird. Der zweite Aktivitätsgipfel, bedingt durch das gebildete Na-¹²⁵I-Salz, folgt meist im 19. bis 23. Röhrchen.

Die Fraktionen mit der höchsten Aktivität innerhalb des Hormon-peaks werden als Tracer im RIA eingesetzt. Hierzu wird das konzentrierte Eluat mit 0.01 M - Phosphatpuffer soweit verdünnt, daß 15 - 20 000 cpm/0.1 ml gemessen werden.

Eine Rechromatographie des Tracers an der Sephadex-G 50-Säule erwies sich nach unseren Erfahrungen als überflüssig.

Elutionsprofil der ¹²⁵I-HCG- β -Markierung



3.3.2 Durchführung des RIA für HCG- β

HCG- β -Antigen, Kaninchen-Anti-HCG- β (1. AK) und der Standard (Charge WS 90-4002) wurden von der Firma SERONO, Rom - bezogen.

3.3.2.1 Pufferlösungen und Einzelreagentien

Puffer 1:

0.01 M-Phosphatpuffer	pH 7,4	500 ml
0.05 M-EDTA- Na_2		18.6 g
pH nach EDTA-Zugabe wieder auf 7,4 einstellen		
Normal-Kaninchenserum	1 : 400 - Verd.	1,25 ml

Puffer 2 :

0.01 M-Phosphatpuffer	pH 7,4	500 ml
0.25 % Rinderalbumin		1.25 g
0.05 % NaCl		250 mg

Puffer 3 :

0.01 M-Phosphatpuffer pH 7,4

1. Antikörper

10 μg HCG- β -AK wurden in 20 ml Puffer 1 gelöst.

Als 2. Antikörper wurde eine Lösung von Anti-Kaninchen-Globulin der Firma WELLCOME, Beckenham, England - in 0.01 M-Phosphatpuffer mit einer Verdünnung 1 : 20 verwendet.

Unmarkiertes Hormon und die Verdünnungen der Standardkurve wurden mit Puffer 2 bereitet.

3.3.2.2 Ansatzschema des HCG- β -RIA

		PROBE 0-WERT T-WERT		
1. Tag	1. Antikörper	0.2	0.2	-
	Serum oder Standard	0.2	-	-
	Puffer 2	-	0.2	0.4
	2 ^h -Inkubation bei 37°C im Trockenschrank			
-----	Markiertes Hormon	0.1	0.1	0.1
	(20 000 cpm)			
2. Tag	24 ^h -Inkubation bei Zimmertemperatur			
	2. Antikörper	0.2	0.2	0.2
-----	24 ^h -Inkubation bei Zimmertemperatur			
	30' Zentrifugieren bei 5 000 U/min. Absaugen des Überstandes Messung der Aktivität des Rückstandes			
3. Tag				

3.3.2.3 Sensitivität, Spezifität und Richtigkeit

Die Sensitivität der Methode lag bei 6 mE/ml (0⁺ 2s).

Der VK interassay (Mittelwert 400 mE/ml) betrug 5,4 %, intra-assay 3,4 %.

Der Einsatz von HCG- β -subunit und eines spezifischen HCG- β -AK ermöglichte die Bestimmung von HCG in Anwesenheit von LH.

Weder HPL noch Prolaktin zeigten Kreuzreaktivität.

Erst bei sehr hohen Konzentrationen von 100 ng/0.2 ml trat Kreuzreaktion mit LH (1.65 %) ein.




Abb. 5: HCG-β-Standardkurve (WS 90-4002)

Da der Meßbereich der Methode zwischen 6 und 800 mE/ml (Standardsubstanz WS 90-4002, II. Internationaler Standard) lag, mußten entsprechend der SSW die Seren zur HCG-β-Bestimmung mit Puffer 2 verdünnt werden:

Verdünnungsschema

5. - 6.	7. - 8.	9. - 13. SSW	
1 : 10	1 : 100	1 : 500	
14. - 15.	16. - 30.	31. - 37.	38. - 42. SSW
1 : 100	1 : 50	1 : 100	1 : 50

6. ZUSAMMENFASSUNG

- 1) Aus 720 Einzelanalysen wurden die Normalbereiche der Prolaktin-, HCG- und HPL-Serumkonzentrationen während der Schwangerschaft ermittelt. Dabei entsprachen die gefundenen HCG- und HPL-Konzentrationen weitgehend den in der Literatur beschriebenen Werten, während unsere Prolaktinverlaufskurve bis zum Vielfachen niedriger als die anderer Autoren lag.
- 2) Auch mit dem HCG- β spezifischen RIA ließ sich für den HCG-Verlauf der zweite Peak im Zeitraum der 33. bis 37. SSW nachweisen.
- 3) Die longitudinalen Verlaufskontrollen von Prolaktin, HCG und HPL in 10 normalen Schwangerschaften erbrachten durchwegs Konzentrationen im ermittelten 2-s-Normbereich.
- 4) Postpartal imponierte ein signifikanter Prolaktinanstieg nach 1 Stunde. 4 Stunden post partum war die Prolaktinkonzentration dem 10-Minuten-pp-Wert vergleichbar. Die Ursache dieses Peaks ist vermutlich im vorangegangenen Geburtsstreß zu sehen.
- 5) Die Prolaktinkonzentrationen der 9 Patientinnen lagen teilweise über, teilweise unter dem 2-s-Normbereich. Eine befriedigende Erklärung für die große Variabilität der Prolaktinverläufe kann im Augenblick nicht gegeben werden.

- 6) Bei den 9 Patientinnen mit Hyperprolaktinämie fanden sich intra graviditatem normale HCG- und HPL-Konzentrationen.
- 7) 6 der 9 Patientinnen entwickelten in der Schwangerschaft Ödeme. Ansonsten blieben die Schwangerschaften ohne nennenswerten Befund. Bisher liegen auch keine Hinweise dafür vor, daß Hypophysenprolaktinome durch eine Schwangerschaft in ihrem Wachstum bzw. in ihrer Sekretion stimuliert würden.
- 8) Sämtliche Kinder der 9 Schwangerschaften nach hyperprolaktinämischer Amenorrhoe waren klinisch unauffällig.

3.3.3.2 hPRL-Standardkurve (MRC 71/222)




Abb. 6: hPRL-Standardkurve (MRC 71/222)

Je nach vorliegender Prolaktinkonzentration müssen die Seren entsprechend mit Puffer verdünnt werden.

<u>Puffer zur Verdünnung:</u>	1000	ml 0.01 M-Phosphatpuffer
	10	g Rinderalbumin
	3,722	g EDTA- Na_2
	8,766	g NaCl

3.3.4 HUMAN PLACENTAL LACTOGEN - HPL

Die Bestimmung erfolgte nach einem radioimmunologischen Testverfahren ("kit") der Firma PHADEBAS/Uppsala, Schweden. Der Phadebas-Test entspricht weitgehend der 1971 von LETCH-WORTH (41) beschriebenen Methode.

3.3.4.1 Bereitung der Reagentien

Die im "kit" gelieferten lyophilisierten Substanzen wurden entsprechend der Vorschrift gelöst. Mit diesen Lösungen konnten HPL-Konzentrationen ab der 7. SSW erfaßt werden.

3.3.4.2 Ansatzschema des HPL-RIA

	PROBE	O-WERT	T-WERT
Serum oder Eichlsg.	0.1	-	-
Antikörper I	0.2	0.2	-
¹²⁵ J-HPL-Tracer	0.2	0.2	0.2
Diluent (Puffer)	-	0.1	0.3
30' (bzw. 60') Inkubation			
Zugabe von 1,0 ml Äthanol oder Isopropanol			
2 min. mit 5 000 U/min. zentrifugieren			
Absaugen des Überstandes			
Aktivitätsmessung des Rückstandes mit dem γ -Zähler			

3.3.4.3 Sensitivität und Kreuzreaktivität

Der HPL-RIA zeigte keine Kreuzreaktivität zu HCG, hPRL und LH. Als Referenzsubstanz diente eine HPL-Standardpräparation der Firma Phadebas.

Die Empfindlichkeit der Methode lag bei 25 ng/ml (0^{+2}_s).

Der VK interassay betrug 6,5 %, intraassay 4,9 %.

4. ERGEBNISSE

4.1 Mittelwert und 95 % - Vertrauensbereich der Serumkonzentration von HPL, HCG und hPRL in der Normal-schwangerschaft und post partum

4.1.1 Placentares Lactogen (HPL)


4.1.1.1 HPL während der Schwangerschaft

Aus 807 Einzelseren wurden die Durchschnittswerte für HPL im Serum von der 5. bis 42. SSW ermittelt.

Frühestens in der 7. SSW kann gesichert HPL im Nanogrammbe-reich nachgewiesen werden. In den folgenden Wochen erfolgt ein kontinuierlicher Anstieg der Serumkonzentration, die in der 15. SSW den Wert von 1 μ g/ml überschreitet. Die Kurve erreicht in der 36. SSW mit einem Mittelwert von $6,5^{+1,4}$ μ g/ml ihr Maxi-mum. Für die restlichen Schwangerschaftswochen fanden wir eine leicht abfallende Tendenz im Kurvenverlauf. Die 41. SSW zeigt eine mittlere HPL - Konzentration von $5,8^{+1,4}$ μ g/ml.

Die zugehörigen Werte sind Tabelle I sowie Abbildung 7 zu ent-nehmen.

Abb. 7: HPL-Serumkonzentrationen ($\mu\text{g/ml}$) in der Normal-
schwangerschaft



4.1.1.2 HPL post partum

Bei regulärem Schwangerschaftsverlauf entspricht die Hormonkonzentration kurz vor der Entbindung den Werten der letzten Schwangerschaftstage oder liegt knapp darunter. 10 min. post partum werden etwa noch 60 % der Ausgangskonzentration gemessen und der 1-Stundenwert zeigt Konzentrationen, die unter $1 \mu\text{g/ml}$ liegen. 4 Stunden pp läßt sich mit der Phadebasmethode kein HPL mehr nachweisen. Somit wird HPL in wenigen Stunden vollständig aus dem mütterlichen Kreislauf eliminiert.

Tabelle I: HPL-Elimination post partum

Zeit	1 ^h ap	partus	10' pp	1 ^h pp	4 ^h pp
2-s-Normbereich (µg HPL/ml Serum)	3, 0-8, 7	3, 0-5, 7	1, 0-5, 3	0-1, 0	0

4.1.2 Human Chorionic Gonadotropin (HCG)

4.1.2.1 HCG während der Schwangerschaft

Aus 357 Einzelseren wurden die Durchschnittswerte von HCG im Serum von der 5. bis 41. SSW ermittelt.

In der 5. SSW post menstruationem bzw. der 2./3. SSW post ovulationem beginnt die meßbare HCG-Produktion im Trophoblasten des Implantates. Die HCG-Werte steigen rasch an und erreichen in der 10. SSW ihr Maximum mit etwa $40\,000 \pm 10\,500$ mE/ml. Bis zur 14. SSW erfolgt ein gedehnter Abfall und mit der 15./16. SSW ergibt sich ein leicht schwankender horizontaler Kurvenverlauf mit Mittelwerten von $4\,000$ bis $8\,000 \pm 3\,000$ mE/ml. In der 34. bis zur 37. SSW stellt sich ein kleiner Gipfel mit etwa $11\,000$ mE/ml dar, dessen Bedeutung allerdings unklar bleibt.

Tabelle II und Abbildung 8 + 9 zeigen den Verlauf der HCG-Konzentrationen von der 5. bis zur 41. SSW.

Abb. 8: HCG-Serumkonzentrationen (mE/ml) in der Normal-schwangerschaft





Abb. 9: Einzelwerte der HCG-Kurve



4.1.2.2 HCG post partum

Die HCG-Konzentration während der Entbindung entspricht den Werten der letzten Schwangerschaftstage. Häufig zeigt der 10 Minuten pp gemessene Wert eine geringfügige Erhöhung. Nach einer Stunde liegen noch ca. 85 % meßbares HCG vor und nach 4 Stunden ca. 60 %. Nach 24 Stunden konnten wir noch durchschnittlich 30 % des Ausgangswertes feststellen. Aus diesen Zahlen errechnet sich für die Elimination von HCG eine 1. Halbwertszeit von 4 - 6 Stunden und eine 2. von 24 Stunden. Der weitere und vollständige Abbau erfolgt mit einer 3. Halbwertszeit, deren Gesetzmäßigkeit wir nicht verfolgten.

Tabelle B : HCG-Elimination post partum

Zeit	$\pm$ 2s-Normbereich (mE/ml)
1 ^h ap	1 395 - 9 274
partus	528 - 9 030
10 ^h pp	1 386 - 9 193
1 ^h pp	1 086 - 7 849
4 ^h pp	500 - 6 116
24 ^h pp	527 - 2 683

4.1.2 Prolaktin (hPRL)

4.1.2.1 hPRL in der Schwangerschaft

Von 716 Einzelseren der 5. bis 41. SSW wurden die Durchschnittswerte ermittelt. Die zugehörigen Werte sind Tabelle III sowie Abbildung 10 zu entnehmen.

Bis zur 11./12. SSW pendeln die Mittelwerte der Serumkonzentrationen im Bereich von 200 - 600 μ E/ml.

Etwa ab der 13. SSW folgt ein rascher Anstieg der hPRL-Konzentrationen. In der 15. SSW wird ein Durchschnittswert von 1 000 $\mu\text{E/ml}$ überschritten und in der 19. SSW 2 000 $\mu\text{E/ml}$ erreicht. Werte von 3 000 $\mu\text{E/ml}$ werden ab der 30. SSW gemessen. Während der restlichen SSW liegen die Mittelwerte in einem Intervall, das den Bereich 3 000 - 3 500 $\pm$ 2 000 $\mu\text{E/ml}$ umfaßt.




Abb. 10 : hPRL-Serumkonzentrationen ($\mu\text{E/ml}$) in der Normalschwangerschaft

4.1.2.2 hPRL post partum

Die hPRL-Konzentration während der Entbindung entspricht den Werten der letzten Schwangerschaftstage. Auffällig bleibt der positive peak zwischen den Blutabnahmen 10 min. und 1 Stunde post partum. Im Wilcoxon-Test ($p < 0.05$) ergab sich für diesen Bereich ein signifikanter Anstieg. Im verfolgten Zeitraum (bis zum 7. Tag pp) fallen die hPRL-Werte auf Konzentrationen von 40 - 80 % des 24^h-Wertes pp ab. Unberücksichtigt bei dieser Betrachtung bleibt der eminente hPRL-Anstieg etwa 30 min. jeweils nach dem Stillen. Normalerweise kehrt der reflektorisch ausgelöste Hormonpeak innerhalb von 2 Stunden wieder zu seinem Ausgangswert zurück.

4.2. Verläufe der Serumkonzentrationen von HPL, HCG und hPRL während der Schwangerschaft und post partum bei normoprolaktinämischen Patientinnen (N = 10)

4.2.1 HPL-Verlauf während der Schwangerschaft und post partum

Charakteristisch für jede Schwangere ist eine individuelle HPL-Kurve, die weitgehend parallel dem Verlauf der Mittelwertkurve folgt. Zusammenfassend läßt sich sagen, daß bei allen 10 Patientinnen die gemessenen Werte sowohl in der Schwangerschaft als auch post partum stets im ermittelten 2-s-Bereich lagen.

Die Einzelkonzentrationen sind in Wertetabelle X aufgeführt.

4.2.2 HCG-Verlauf während der Schwangerschaft und post partum

Sämtliche in der Schwangerschaft und post partum gemessenen Werte lagen im 2-s-Normbereich.

(siehe Wertetabelle XI)

4.2.3 hPRL-Verlauf während der Schwangerschaft und post partum

Bei 5 von 10 Patientinnen konnte der Prolaktinverlauf sowohl in der Schwangerschaft als postpartal verfolgt werden. Lediglich am Geburtstermin und post partum konnte bei 5 weiteren Patientinnen Blut abgenommen werden.

Bei 8 von 10 Patientinnen fanden wir einen signifikanten Anstieg ($p < 0.05$) der hPRL-Werte von 10 μ p und 1 Stunde pp. Zwei Fälle blieben ohne Veränderung.

Sämtliche Patientinnen zeigten in der SS und post partum Werte im bekannten 2-s-Normbereich.

Bis zum 7. Tag post partum fallen die Prolaktinwerte ab. Nach einer Woche werden Konzentrationen gemessen, die noch 40 - 80 % des 24^h-pp-Wertes erreichen.

Tabelle D und E zeigen die Prolaktinwerte der 10 normoprolaktinämischen Patientinnen im Zeitraum von 1 Stunde ap bis zum 7. Tag post partum.

Tabelle D : Prolaktinwerte (μ E/ml Serum) im Zeitraum von 1 Stunde ap bis 24 Stunden pp

Name	1 ^h ap	partus	10 ^h pp	1 ^h pp	4 ^h pp	24 ^h pp
A. He.	1 793	-	3 234	3 795	-	3 000
B. B.	-	4 433	1 866	1 815	1 397	1 804
B. H.	-	-	1 716	2 376	-	2 981
G. B.	5 050	5 150	2 700	4 285	4 571	3 650
H. C.	2 497	-	3 718	7 720	1 500	4 037
H. R.	4 004	3 069	2 266	3 795	3 790	1 770
H. W.	1 670	2 650	1 602	2 016	2 340	1 890
K. H.	1 530	-	1 595	3 564	1 309	3 102
N. A.	2 772	-	-	1 860	3 170	2 827
P. B.	4 670	-	4 048	7 770	3 640	3 730

Tabelle E : hPRL-Konzentrationen im Wochenbett (2. - 7. Tag post partum)

Name	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag pp
A. He.	-	3 052	-	-	-	-
B. B.	-	3 240	-	1 560	-	-
B. H.	-	2 838	-	1 925	-	1 543
G. B.	-	1 991	-	2 480	-	1 584
H. C.	3 120	-	2 794	1 518	-	1 850
H. R.	-	2 079	-	1 726	-	-
H. W.	-	1 272	-	1 332	-	2 365
K. H.	-	3 179	-	1 848	-	2 112
N. A.	-	2 805	-	-	-	-
P. B.	-	3 542	-	1 144	-	3 278

4.2.4 Graphische Darstellung der Verläufe von HPL, HCG und hPRL während der Normalschwangerschaft und post partum (N = 10)

In den Abb. 11 - 20 sind die Verläufe von HPL, HCG und hPRL bei 10 Patientinnen während der Schwangerschaft dargestellt, während die Abb. 21 - 30 den Verlauf post partum zeigen.

Abb. 11 / Pat. B.H.
30 Jahre




Abb. 12 / Pat. B.T.
29 Jahre




Abb. 13 / Pat. C.L.
25 Jahre




Abb. 14 / Pat. H.C.
24 Jahre




Abb. 15 / Pat. H.R.
33 Jahre




Abb. 16 / Pat. H.W.
30 Jahre




Abb. 17 / Pat. K.B.

29 Jahre




Abb. 18 / Pat. K.H.

32 Jahre




Abb. 19 / Pat. P.B.

30 Jahre




Abb. 20 / Pat. S.E.

37 Jahre




Abb. 21 / Pat. A.H., 27 Jahre




Abb. 22 / Pat. B.B., 33 Jahre




Abb. 23 / Pat. B.H., 30 Jahre




Abb. 24 / Pat. G.B., 30 Jahre




Abb. 25 / Pat. H.C., 24 Jahre




Abb. 26 / Pat. H.R., 33 Jahre




Abb. 27 / Pat. H.W., 30 Jahre




Abb. 28 / Pat. K.H., 32 Jahre




Abb. 29 / Pat. N.A., 25 Jahre





Abb. 30 / Pat. P.B., 30 Jahre



4.3. Verläufe der Serumkonzentrationen von HPL, HCG und hPRL während der Schwangerschaft und post partum bei 9 Patientinnen nach behandelter hyperprolaktinämischer Amenorrhoe

4.3.1 HPL-Verlauf während der Schwangerschaft und post partum

Sämtliche 9 Patientinnen zeigten in der Schwangerschaft und post partum HPL-Konzentrationen, die innerhalb des 2-s-Normbereiches lagen (Wertetabellen IV/VII).

4.3.2 HCG-Verlauf während der Schwangerschaft und post partum

Alle in der Schwangerschaft und post partum gemessenen Werte liegen im 2-s-Bereich. Zu erwähnen bleibt, daß bei diesen Patientinnen die HCG-Konzentrationen häufig im unteren 2s-Teil gefunden wurden.

(siehe Wertetabelle VIII/XI)

4.3.3 hPRL-Verlauf während der Schwangerschaft und post partum

In fast allen Fällen unterscheidet sich der Prolaktinverlauf bei den mit CB 154 behandelten Patientinnen auffällig vom Hormonverlauf der Normalschwangerschaft.

Folgende Tabelle zeigt für jede Patientin (N = 9) die Schwangerschaftswochen, in denen hPRL-Werte in oder außerhalb des 2-s-Normbereiches lagen.

Tabelle F : hPRL-Konzentrationen während der SS bei den mit CB 154 behandelten Patientinnen

Name	Alter	para	Abb.	2-s-Normbereich	
				innerhalb	außerhalb
G. T.	29	I	31	8. - 38. SSW	-
H. M.	27	I	32	-	7. - 40. SSW
K. B.	33	I	33	19. - 31. SSW	10. - 18. SSW
					32. - 41. SSW
M. E.	25	I	34	19. - 39. SSW	6. - 12. SSW
				Hypophysektomie	in der 12. SSW
M. I.	36	II	35	18. - 41. SSW	5. - 17. SSW
N. M.	31	I	36	23. - 40. SSW	5. - 22. SSW
P. B.	25	I	37	-	9. - 38. SSW
R. M.	40	I	-	Keine Daten über den SS-Verlauf!	
S. E.	38	II	38	13. - 30. SSW	5. - 12. SSW
					30. - 41. SSW

Die Tabellen G und H geben einen Überblick zu den Prolaktinkonzentrationen im Zeitraum von 1 Stunde ap bis zum 7. Tag post partum.

Tabelle G : Prolaktinwerte ($\mu\text{E/ml}$) im Zeitraum von 1 Stunde ap bis 24 Stunden pp

Name	1 ^h ap	partus	10 ^h pp	1 ^h pp	4 ^h pp	24 ^h pp
G. T.	4 813	-	5 975	8 224	7 190	3 070
H. M.	10 440	10 300	11 420	9 534	9 450	9 513
M. I.	2 841	2 468	2 411	2 814	2 088	2 022
M. E.	2 816	3 036	3 047	3 399	3 300	3 069
N. M.	-	2 436	2 640	2 337	2 250	1 602
P. B.	16 302	15 378	16 170	14 454	15 700	15 700
K. B.	4 400	4 405	2 117	5 978	4 086	4 361
R. M.	7 350	-	8 650	-	8 550	8 530
S. E.	1 012	-	1 562	-	1 133	990

4 von 9 Probandinnen zeigen ebenfalls den auffälligen hPRL-Anstieg vom 10^hpp- zum 1 Stunden-pp-Wert. 3 der 9 Patientinnen folgen diesem Verlauf nicht und bei zweien liegt keine vergleichende Blutabnahme vor.

Während des Wochenbettes (bis zum 7. Tag pp) fällt in 6 von 9 Fällen der hPRL-Spiegel auf Werte zwischen 40 - 70 % des jeweiligen 24^h-pp-Wertes ab. Bei 2 Probandinnen blieb die Konzentration unverändert. Die Mutter des verstorbenen Kindes kann in dieser Betrachtung wegen ihrer Entlassung am 4. Tag pp nicht berücksichtigt werden. Der prozentuale hPRL-Abfall post partum entspricht weitgehend dem bei normoprolaktinämischen Schwangerschaften, wenngleich die Ausgangswerte bei der Entbindung für die absolute Prolaktinkonzentration bestimmend bleiben.

Tabelle H: hPRL-Konzentrationen im Wochenbett (E/ml)
(2. - 7. Tag post partum)

Name	2. Tag	3. Tag	4. Tag	5. Tag	6. Tag	7. Tag pp
G. T.	-	3 885	Entlassung, Kind am 2. Tag pp			
H. M.	-	8 207	-	5 640	-	6 804
M. I.	-	1 327	-	550	-	-
M. E.	-	2 860	-	2 343	-	2 112
N. M.	1 747	1 203	1 755	-	882	611
P. B.	-	13 002	17 490	12 474	-	15 128
K. B.	-	3 734	-	3 008	-	2 145
R. M.	-	8 750	-	8 150	-	8 480
S. E.	-	902	-	693	-	650

In den Abb. 31 - 38 sind die Verläufe von HPL, HCG und hPRL bei 8 Patientinnen während der Schwangerschaft dargestellt, während die Abb. 39 - 47 den Verlauf post partum von 9 Patientinnen zeigen.

4.3.4. Graphische Darstellung der Verläufe von HPL, HCG und hPRL während der Schwangerschaft (N = 8) und post partum (N = 9)

Abb. 31 / Pat. G.T.
29 Jahre




Abb. 32 / Pat. H.M.
27 Jahre




Abb. 33 / Pat. K.B.
33 Jahre




Abb. 34 / Pat. M.E.
25 Jahre




Abb. 35 / Pat. M.I.
36 Jahre




Abb. 36 / Pat. N.M.
31 Jahre




Abb. 37 / Pat. P.B.
25 Jahre




Abb. 38 / Pat. S.E.
38 Jahre




Abb. 39 / Pat. G.T., 29 Jahre




Abb. 40 / Pat. H.M., 27 Jahre




Abb. 41 / Pat. K.B., 33 Jahre




Abb. 42 / Pat. M.E., 25 Jahre




Abb. 43 / Pat. M.I., 36 Jahre




Abb. 44 / Pat. N.M., 31 Jahre




Abb. 45 / Pat. P.B., 25 Jahre




Abb. 46 / Pat. R.M., 40 Jahre





Abb. 47 / Pat. S.E.,

38 Jahre



4.4 Schwangerschaftsverlauf der Patientinnen aus beiden Vergleichsgruppen

4.4.1 Gruppe der Normalschwangerschaften

Pat.	Alter (Jahre)	para	Blutdruckbereiche syst./diast. (mm Hg)	Ödeme	KG (kg)
B.H.	30	I	100-125/ 60- 85	-	10,5
B.T.	29	I	100-120/ 60- 80	-	11,5
C.L.	25	I	95-120/ 60- 95	-	10,5
H.C.	24	II	95-125/ 60- 85	-	10,5
H.R.	33	II	110-155/ 60- 90	-	9,2
H.W.	30	I	100-125/ 60- 80	(+)	15,6
K.B.	29	II	110-120/ 65- 80	(+)	10,0
K.H.	32	I	90-120/ 60- 80	+	12,1
P.B.	30	IV	90-120/ 60- 90	-	9,0
S.E.	37	I	105-150/ 70-100	-	12,4
S.M.	25	I	100-125/ 60- 90	-	11,8

4.4.2 CB 154-Gruppe

G.T.	29	I	100-120/ 60- 80	-	4,4
H.M.	27	I	110-130/ 60- 80	+	13,7
K.B.	33	I	90-120/ 60- 80	+	11,0
M.E.	25	I	110-140/ 60- 80	+	18,8
M.I.	36	II	120-150/ 70- 90	+	9,8
N.M.	31	I	95-125/ 60- 80	+	9,2
P.B.	25	I	100-120/ 50- 80	-	7,0
R.M.	40	I	110-140/ 65-110	(+)	11,7
S.E.	38	II	90-115/ 50- 75	-	13,6

4.4.3 Ergebnis

Hinsichtlich der Blutdruckbereiche, der Gewichtsentwicklung in der Schwangerschaft und weiterer, hier nicht aufgeführter Parameter, zeigte sich kein auffälliger Unterschied zwischen beiden Gruppen. Von 9 Patientinnen der CB 154-Gruppe entwickelten 6 massive Ödeme. Allerdings ließen sich weder eine Proteinurie noch ein Hypertonus nachweisen!

4.5 Vergleichende Betrachtung der Geburtsdaten in beiden Patientinnengruppen

Tabelle P : Daten zur Geburt / Daten der Neugeborenen

<u>Daten der Mütter zur Geburt</u>				<u>Daten der Kinder</u>				
Name	para	Alter (Jhr.)	Entbin- dung	Geburt SSW	Plazen- tagew. (g)	Ge- schlecht	Gewicht (g)	Länge (cm)
A. Ha.	I	27	vag.	40.	730	männl.	3 550	54
A. He.	II	37	vag.	41.	780	männl.	3 700	51
B. B.	II	38	vag.	39.	630	männl.	3 860	55
G. B.	I	30	vag.	39.	520	weibl.	3 400	51
H. R.	II	33	vag.	40.	630	weibl.	3 270	51
H. W.	I	30	sectio	42.	610	männl.	2 750	50
K. H.	I	32	vag.	40.	530	männl.	3 530	51
K. B.	II	29	vag.	40.	670	männl.	3 550	53
N. A.	III	25	vag.	36.	480-N	weibl.	2 280	47
P. B.	IV	30	vag.	38.	420	männl.	2 950	48
				Zwillings-SS	495	weibl.	2 440	48
S. E.	I	37	vag.	40.	600	weibl.	3 640	51
S. M.	I	25	vag.	42.	500	weibl.	3 390	51

Daten der Mütter zur Geburt

Daten der Kinder

Name	para	Alter (Jhr.)	Entbind- dung	Geburt SSW	Plazen- tagew. (g)	Ge- schlecht	Gewicht (g)	Länge (cm)
CB 154-Gruppe								
G. T.	I	29	vag.	37.	400	männl.	2 280	47
H. M.	I	27	vag.	40.	600-N	männl.	3 770	54
K. B.	I	33	vag.	40.	630	männl.	3 700	54
M. E.	I	25	vag.	38.	620	männl.	3 300	50
M. I.	II	36	vag.	40.	610	weibl.	2 900	49
N. M.	I	31	vag.	40.	500-N	weibl.	3 110	50
P. B.	I	25	sectio	38.	580	männl.	2 080	51
R. M.	I	40	vag.	40.	560	weibl.	3 050	52
S. E.	II	38	sectio	38.	510	männl.	3 350	53

N- = Nebenplacenta

Zusammenfassend ist festzustellen, daß zwischen den Neugeborenen beider Vergleichsgruppen kein Unterschied des Gesundheitszustandes gefunden wurde. Die Untersuchung verschiedener Parameter (siehe Tabelle P) zeigte, daß weder in der Kindesentwicklung, im Geburtsverlauf, noch hinsichtlich des Reifezustandes auffällige Differenzen bestanden.

Der Tod des Neugeborenen (Pat. G. T.) aus der CB 154-Gruppe ist auf eine "Sepsis mit Endotoxinschock", Herd: frische otitis media - zurückzuführen und steht in keinem Zusammenhang zu unserer Untersuchung. SEKTIONSPROTOKOLL-Nr. 300 des Pathologischen Instituts der Univ. München vom 17.05.1976 / Obduzent Dr. Laakso

Auffällig war jedoch, daß mit CB 154 behandelte Patientinnen während der Schwangerschaft vermehrt Symptome einer EPH-Gestose entwickelten. Aus dieser Beobachtung läßt sich ein Zusammenhang zwischen meist überdurchschnittlich hohen Prolaktinkonzentratio-

nen in der Schwangerschaft und dem gehäuften Auftreten der EPH-Symptomatik diskutieren.

5. DISKUSSION

Die spezifisch quantitative Bestimmung von Prolaktin (hPRL) aus dem menschlichen Serum ist seit 1971 möglich (HWANG, 35). Seit-her wurde die Bedeutung dieses Hormons für Zyklusstörungen in zunehmendem Maße erkannt. In der Hyperprolaktinämie fand man für die Amenorrhoe-Galaktorrhoe-Syndrome (AHUMADA-DEL CASTILLO-Syndrom, 1; CHIARI-FROMMEL-Syndrom, 14; FORBES-ALBRIGHT-Syndrom, 20) eine gemeinsame pathophysiologische Ursache (Übersicht siehe HORROBIN, 33).

Während die Rolle von Prolaktin für die Pathogenese dieser Störungen durch viele Untersuchungen (6, 24, 52, 67) gesichert ist, liegen keine ausreichenden Befunde über die Prolaktinsekretion in Normalschwangerschaften und über die hPRL-, HCG- und HPL-Konzentrationen in Schwangerschaften vor, die bei Patientinnen mit Hyperprolaktinämie induziert wurden.

Normalbereich für hPRL in der Schwangerschaft :

Die Produktion von Prolaktin in der Schwangerschaft erfolgt in den sog. Schwangerschaftszellen des HVL (ERDHEIM, 17; ROMEIS, 53). Mit Hilfe der Immunfluoreszenzmethode identifizierten HERBERT und HAYASHIDA (30) im Jahre 1970 die bis dahin nur histolo-

gisch beschriebenen Schwangerschaftszellen eindeutig als Prolaktinbildner. In der Literatur finden sich zwar übereinstimmend steigende Serumkonzentrationen für Prolaktin mit zunehmender Schwangerschaftsdauer, jedoch liegen die angegebenen Konzentrationen zum Entbindungstermin zwischen den 5-fachen (L'HERMITE, 43) und 17-fachen (TYSON, 63) der Ausgangskonzentrationen. Unsere Ergebnisse stimmen mit den von BISWAS und RODECK (5), SCHMIDT-GOLLWITZER (57) und SCHENKER (56) veröffentlichten überein. Danach erreicht die mittlere hPRL-Konzentration in der 38. SSW mit $128 \text{ ng/ml} = 3\,200 \text{ } \mu\text{E/ml}$ ihr Maximum und beträgt ca. das 7-fache des Mittelwertes der 8. SSW (BISWAS und RODECK, 5).

Unser 2-s-Normbereich wurde aus 720 Einzelanalysen ermittelt. Bis zur 12. SSW bleibt die Prolaktinsekretion relativ unbeeinflusst ($\leq 1\,000 \text{ } \mu\text{E/ml}$), erreicht in der 30. SSW einen Mittelwert von $3\,000 \pm 1\,500 \text{ } \mu\text{E/ml}$ und steigt im letzten Schwangerschaftsdrittel nur noch leicht auf $3\,500 \pm 1\,500 \text{ } \mu\text{E/ml}$ an.

Normalbereich für HPL in der Schwangerschaft :

HPL kann frühestens in der 6. bis 7. SSW im Serum nachgewiesen werden. Die Konzentrationen liegen in der 17. SSW um $1\,000 \text{ ng/ml}$, in der 21. SSW bei $2\,000 \text{ ng/ml}$, in der 27. SSW bei $3\,000 \text{ ng/ml}$ und ab der 30. SSW zwischen $4\,000$ und $6\,500 \text{ ng/ml}$. Die Werte unseres, aus 820 Einzelanalysen ermittelten 2-s-Normbereiches, stimmen weitgehend mit den von GEIGER (27), LETCHWORTH (40) und SPELLACY (60) publizierten Ergebnissen überein.

Normalbereich für HCG in der Schwangerschaft :

Nach JAFFE (37) gelingt der erste HCG-Nachweis mit einem spezifischen RIA für HCG- β -subunit bereits 8 bis 12 Tage post ovulationem. Hinsichtlich des HCG-Verlaufes in der Schwangerschaft entsprechen unsere Ergebnisse denen anderer Autoren (13, 51, 60). Im Intervall der 8. bis 12. SSW kommt es dabei zum Maximum mit einem Wert, der etwa das 10-fache der Konzentration außerhalb dieser Wochen beträgt.

Bis zur 20. SSW erfolgt ein langsamer Abfall, der in den restlichen Schwangerschaftswochen in einen fast horizontalen Kurvenverlauf übergeht.

Wie BRODY (9), MISHELL (45), PRANG und GEIGER (51), fanden auch wir zwischen der 31. und 38 SSW einen zweiten Peak im HCG-Verlauf, der für die Bestimmung mit einem spezifischen RIA für HCG- β -subunit bisher umstritten war (VAITUKAITIS, 65). Zum Entbindungstermin kam es zu erneutem HCG-Abfall.

Verläufe der hPRL-, HCG- und HPL-Konzentrationen im Serum von Patientinnen mit Normalschwangerschaften :

Die hPRL-, HCG- und HPL-Konzentrationen lagen bei allen Patientinnen während des gesamten Schwangerschaftsverlaufes (N = 10) im ermittelten 2-s-Normbereich.

Postpartale Serumkonzentrationen von hPRL, HCG und HPL bei Patientinnen mit Normalschwangerschaften :

Eine Stunde post partum wurde bei den Kontrollpatientinnen signifikant höhere Prolaktinkonzentrationen gemessen als bei der Geburt und 10 Minuten pp. 4 Stunden pp war der Anstieg wieder ausgeglichen. Für diese Beobachtung existiert in der Literatur kein Hinweis. Wir deuten den Peak als Reaktion des hypothalamisch-hypophysären Regelkreises auf den vorangegangenen Geburtsstreß (NOEL, 48).

Die hPRL-Konzentration im mütterlichen Serum betrug 1 Woche post partum noch 40-70 % des 4-Stunden-pp-Wertes. HWANG (34) spricht dagegen von 15 und BRUN DEL RE (11) von 30 Prozent des Mittelwertes gegen Ende der Schwangerschaft, während nach TYSON (63) zu diesem Zeitpunkt bereits Konzentrationen wie vor der Schwangerschaft bestehen. Da wir Wert darauf legten, daß die Patientinnen nach Möglichkeit stillten, könnten unsere höheren Werte durch eine durch den Saugreiz reflektorisch erhöhte Prolaktinsekretion erklärt werden (FRANTZ, 21). 3 Monate post partum wurden jedenfalls nach Normalschwangerschaften wieder normoprolaktinämische Serumkonzentrationen von weniger als 500 $\mu\text{E/ml}$ erreicht.

Die Untersuchung der HCG-Elimination aus dem mütterlichen Serum post partum ergab eine 1. Halbwertszeit von 4-6 Stunden und eine 2. von 24 Stunden. Normalerweise kann 14 Tage pp in Serum und Urin kein HCG mehr nachgewiesen werden. Übereinstimmende Ergebnisse beschrieben GEIGER (26), JAFFE (37) und PRANG (51).

Die postpartale HPL-Elimination aus dem mütterlichen Serum ist bereits wenige Stunden nach der Plazentalösung beendet. 4 Stunden

post partum konnte mit der Phadebas^R-Methode (Erfassungsgrenze 25 ng/ml) kein HPL mehr nachgewiesen werden (PRANG, 27).

hPRL-, HCG- und HPL-Konzentrationen bei Patientinnen mit
hyperprolaktinämischer Amenorrhoe :

Die HCG- und HPL-Konzentrationen lagen während der gesamten Schwangerschaft im 2-s-Normbereich.

Nach der Anamnese lassen sich die 9 Patientinnen in drei Gruppen einteilen :

a) Schwangerschaften nach selektiver Adenektomie mit postoperativer Prolaktinsuppression (N = 2)

Nach Absetzen von CB 154 bei positivem Pregnosticon^R-Test stiegen die hPRL-Konzentrationen sofort wieder in den postoperativen Bereich an.

In der 12. SSW erreichte die Pat. K.B. eine Prolaktinkonzentration von 3 200 $\mu\text{E/ml}$, die bis zum Entbindungstermin auf 6 000 $\mu\text{E/ml}$ anstieg. 4 Wochen post partum lagen die hPRL-Konzentrationen um 3 500 $\mu\text{E/ml}$, wie vor Beginn der Schwangerschaft.

Bei der Patientin M.E. stieg die Prolaktinkonzentration nach Absetzen von CB 154 auf 2 000 $\mu\text{E/ml}$. In der Schwangerschaft kam es noch zu einem Anstieg auf 3 400 $\mu\text{E/ml}$. Somit lagen die Prolaktinkonzentrationen über weite Strecken der Schwangerschaft im Normbereich. Post partum erfolgte ein rascher Abfall auf Werte unter 1 500 $\mu\text{E/ml}$, die mit den prägraviden Konzentrationen vergleichbar waren.

b) Schwangerschaft bei nichtoperiertem, radiologisch
nachgewiesenem Hypophysenadenom (N = 1)

Bei der Pat. P.B. stiegen die hPRL-Konzentrationen bis zur 12. SSW auf 8 000 $\mu\text{E/ml}$. Nach der 20. SSW kam es zu weiterem Anstieg, wobei zum Geburtstermin 17 000 $\mu\text{E/ml}$ erreicht wurden. 3 Monate post partum blieben die hPRL-Konzentrationen auf 8 500 $\mu\text{E/ml}$ erhöht. Damit konnte ein Adenomwachstum während der Schwangerschaft nicht ausgeschlossen werden. Obwohl keine klinischen Symptome dafür auftraten, wurde die Patientin 4 Monate postpartal selektiv adenomektomiert.

c) Schwangerschaften bei Patientinnen mit hyperprolaktinämischer Amenorrhoe bei normaler sella turcica
(N = 6)

Nach Absetzen von CB 154 bei positivem Pregnosticon^R-Test kam es in 4 Fällen zum steilen hPRL-Anstieg bis zur 15. SSW. Danach änderten sich die Prolaktinkonzentrationen bei 2 Patientinnen nur noch unwesentlich, während sie bei zwei anderen weiter anstiegen und zum Entbindungstermin 10 600 $\mu\text{E/ml}$ (Pat. II. M.) bzw. 7 350 $\mu\text{E/ml}$ (Pat. R. M.) erreichten. Die Prolaktinkonzentrationen der Pat. Sch. E. pendelten in der gesamten Schwangerschaft um 1 000 $\mu\text{E/ml}$. Die Ursache dieser "Sekretionsstarre" ist unklar.

3 Monate post partum lagen die hPRL-Konzentrationen der 6 Patientinnen in oder sogar unter dem Bereich, der vor der CB 154-Applikation bestand.

Besonders zu erwähnen bleibt der postpartale Prolaktinverlauf der Pat. N. M. . Hier normalisierte sich die Prolaktinsekretion nach 6 Monaten vollständig, sodaß spontane Ovulationen eintraten.

Die Patientin wurde ohne weitere Therapie zum zweitenmal schwanger.

Der Nachweis eines signifikanten Prolaktinanstieges im Zeitintervall von 10 min. pp bis 1 Stunde pp ließ sich bei den mit CB 154 behandelten Patientinnen nicht wiederholen.

Klinische Beobachtungen während der Schwangerschaft :

Bei der klinischen Betreuung und Überwachung fiel auf, daß 6 der 9 Patientinnen nach behandelter hyperprolaktinämischer Amenorrhoe in der Schwangerschaft Symptome einer EPH-Gestose entwickelten. Bereits HORROBIN (31) wies 1971 darauf hin, daß Prolaktin auch beim Menschen regulative Funktionen im Wasser- und Elektrolythaushalt ausüben könnte. Systematische Untersuchungen über eine mögliche osmoregulative Potenz von Prolaktin in der Schwangerschaft wurden noch nicht veröffentlicht. Bisherige Arbeiten von COLE (15), BUCKMAN (12) und HORROBIN (32) zeigen lediglich Einzelbeobachtungen voller Widersprüche. Die Frage der Kausalität blieb bisher unbeantwortet (BELLMANN, 2).

Für eine statistische Auswertung unserer Befunde war die Anzahl der untersuchten Fälle (N=9) zu gering.

Einfluß der CB 154-Behandlung auf den Feten :

Über teratogene Eigenschaften von 2-Br- α -Ergocriptin wurde bisher nichts bekannt (BESSER, 3; DEL POZO, 16; THORNER, 61). In einer persönlichen Mitteilung berichtete DEL POZO 1977 über 342 Schwangerschaften, die nach Bromocriptinbehandlung eintraten, wobei ein Teil der Patientinnen vor Therapiebeginn normale Prolaktinkonzentrationen aufwies. In 287 Fällen (83,9%) kam es zu

regulären Geburten. Die Mißbildungsrate der geborenen Kinder lag bei 2,4 %, ein Wert, der ebenso wie die Spontanabortrate von 12,5 % in gleicher Häufigkeit bei Normalschwangerschaften auftritt (FUCHS, 25; EWERBECK, 18). Nach bisherigen Erkenntnissen gibt es also keine Hinweise für eine Teratogenese durch CB 154-Applikation.

Auch die 9 Kinder unserer Untersuchungsgruppe zeigten keine Mißbildungen oder sonstige Gesundheitsschäden.

3.3.2.4 Berechnung der Hormonkonzentrationen

3.3.2.4.1 O- und T-Wert

Bei jedem Ansatz wurden die unspezifische Aktivität, der T- und O-Wert bestimmt. Der Ausdruck O-Wert besagt maximale Bindung des Tracers durch den 1. AK, da kein markiertes Hormon zugesetzt wurde. In der Standardkurve wird dieser Wert als 100 % gesetzt. Mit dem T-Wert wird die unspezifische Bindung der Radioaktivität an Reaktionsgefäß und Bodensatz gemessen. In diesem Röhrchen fehlt der 1. AK, somit kann keine Antigen-Antikörper-Reaktion eintreten.

3.3.2.4.2 Mathematische Auswertung

Von den Aktivitätsraten des O-Wertes und der Einzelproben wird jeweils der T-Wert subtrahiert. Der Quotient beider Divisoren liefert die absolute Zählrate (X) der Probe.

$$X = \frac{B - N}{B_o - N} \times 100 \%$$

B	=	Zählrate der Einzelprobe
B _o	=	" des O-Wertes
N	=	" des T-Wertes
X	=	Prozentwert der gebundenen Aktivität

Die Radioaktivität wurde mit einem automatischen Probenwechsler der Firma BERTHOLD & FRIESICKE (Gammaszinti 5 300) gemessen.

3.3.3 PROLAKTIN (hPRL)

Die Markierung von hPRL wurde im Labor von Herrn PD Dr. von Werder, I. Med. Klinik der Univ. München, durchgeführt. Reinigung des markierten Hormons sowie der hPRL-RIA sind ausführlich bei K. v. WERDER (66) beschrieben.

Als 1. AK verwendeten wir den Kaninchen-AK (VLS 2) gegen gereinigtes Serum-hPRL eines Patienten mit Hypophysentumor (v. WERDER, 67).

Die Verdünnungsreihe des Schwangeren-Sammelserums, das am MRC-Standard 71/222 (Holly Hill, London) geeicht worden war, diente als Standard.

25 ng hPRL entsprechen dabei etwa 500 $\mu\text{E/ml}$.

Die Empfindlichkeit der Methode lag bei 30 $\mu\text{E/ml}$ ($0.3s$).

Der VK interassay (Mittelwert 400 $\mu\text{E/ml}$) betrug 10,9 %, intra-assay 5,2 %.

Der eingesetzte hPRL-AK zeigte keine Kreuzreaktion mit HCG, HPL oder LH.

3.3.3.1 Ansatzschema des hPRL-RIA

		PROBE	T-WERT	O-WERT
1. Tag	1. Antikörper	0.1	-	0.1
	Serum o. Eichlsg.	0.1	-	-
	Puffer	0.1	0.3	0.2
2. Tag	Tracerhormon 15-20 000 cpm	0.1	0.1	0.1
3. Tag	INKUBATION			
4. Tag	2. Antikörper	0.1	0.1	0.1
5. Tag	30' Zentrifugieren bei 5 000 U/min. Absaugen des Überstandes Messung des Aktivitätsrückstandes mit dem γ -Zähler			

Anhang

Wertetabelle	I:	HPL (5. - 41. SSW)
"	II:	HCG "
"	III:	hPRL "
"	IV:	HPL-Konzentrationen während der Normalschwangerschaft/Pat.
"	V:	HCG- "
"	VI:	hPRL- "
"	VII:	HPL-Konzentrationen während der Schwangerschaft/ mit CB 154 behandelte Patientinnen
"	VIII:	HCG- "
"	IX:	hPRL- "
"	X:	HPL-Verlauf post partum/Pat.
"	XI:	HCG- "
"	XII:	hPRL- "

WERTETABELLE I: Pro SSW ermittelte Durchschnittswerte ($\bar{x}$) für HPL im Serum mit Standardabweichung (s) und dem Vertrauensbereich des Mittelwertes für 95 % Wahrscheinlichkeit.

SSW	n	$\bar{x}$ (g/ml)	$(\bar{x})_s$ (g/ml)	Vertrauensbereich
5.	1	0	-	-
6.	4	0	-	-
7.	2	0,025	0,014	0,000 - 0,053
8.	7	0,084	0,078	0,072 - 0,240
9.	6	0,132	0,106	0,080 - 0,344
10.	13	0,148	0,104	0,061 - 0,357
11.	13	0,193	0,080	0,034 - 0,352
12.	17	0,505	0,424	0,344 - 1,354
13.	14	0,473	0,267	0,061 - 1,006
14.	19	0,660	0,257	0,147 - 1,174
15.	20	0,959	0,315	0,329 - 1,589
16.	21	1,082	0,426	0,229 - 1,934
17.	24	1,144	0,289	0,566 - 1,722
18.	23	1,460	0,500	0,459 - 2,459
19.	21	1,431	0,443	0,545 - 2,317
20.	24	1,973	0,639	0,694 - 3,251
21.	24	2,197	0,918	0,362 - 4,033
22.	23	2,416	1,080	0,254 - 4,576
23.	21	2,486	0,864	0,759 - 4,213
24.	21	2,707	0,699	1,310 - 4,104
25.	25	3,437	1,220	0,996 - 5,877
26.	23	4,148	1,554	1,040 - 7,255
27.	25	4,216	1,160	1,895 - 6,537
28.	24	4,440	0,906	2,628 - 6,251

SSW	n	$\bar{x}$ (γ g/ml)	$(\frac{+}{-})_s$ (γ g/ml)	Vertrauensbereich
29.	28	4,957	1,654	1,650 - 8,264
30.	27	4,785	1,038	2,708 - 6,862
31.	27	5,352	1,571	2,208 - 8,496
32.	25	5,588	1,636	2,315 - 8,861
33.	26	5,973	1,655	2,663 - 9,283
34.	26	6,065	1,808	2,448 - 9,682
35.	28	6,028	1,206	3,616 - 8,441
36.	30	6,520	1,394	3,732 - 9,308
37.	32	6,556	1,350	3,856 - 9,256
38.	28	6,425	1,165	4,094 - 8,756
39.	24	6,108	1,066	3,976 - 8,240
40.	35	6,229	1,587	3,055 - 9,402
41.	30	5,837	1,432	2,973 - 8,700
42.	26	5,815	1,437	2,941 - 8,690

WERTETABELLE II : Pro SSW ermittelte Durchschnittswerte ($\bar{x}$) für HCG im Serum mit Standardabweichung (s) und dem Vertrauensbereich des Mittelwertes für 95 % Wahrscheinlichkeit.

SSW	n	$\bar{x}$ (mE/ml)	$(\frac{+}{-})s$ (mE/ml)	Vertrauensbereich	
5.	1	610	-	-	
6.	3	5 040	2 177	670	- 9 379
7.	3	7 156	4 776	271	- 16 707
8.	7	9 587	4 562	462	- 18 712
9.	7	14 518	3 892	6 735	- 22 302
10.	13	39 625	10 440	18 744	- 60 505
11.	14	29 748	8 840	12 068	- 47 430
12.	18	25 828	8 370	9 087	- 42 570
13.	14	15 717	4 370	6 978	- 24 455
14.	19	9 802	3 580	2 641	- 16 962
15.	10	7 824	2 127	3 570	- 12 078
16.	13	8 126	2 119	3 889	- 12 365
17.	9	7 350	2 642	2 066	- 12 633
18.	11	8 585	1 861	4 864	- 12 306
19.	10	8 766	1 800	5 155	- 12 357
20.	9	6 388	2 048	2 293	- 10 484
21.	10	7 132	1 863	3 407	- 10 585
22.	8	7 542	2 682	2 178	- 12 906
23.	10	5 182	2 470	240	- 10 123
24.	7	5 928	3 037	145	- 12 002
25.	9	5 295	3 066	100	- 11 428
26.	9	5 702	2 235	1 232	- 10 173
27.	10	4 617	2 496	86	- 9 614
28.	8	4 943	2 652	48	- 10 246
29.	10	6 182	2 935	312	- 12 050

SSW	n	$\bar{x}$ (mE/ml)	$(\frac{+}{-})_s$ (mE/ml)	Vertrauensbereich	
30.	8	4 965	1 910	1 147	- 8 782
31.	8	7 897	3 222	1 454	- 14 340
32.	9	6 548	2 860	830	- 12 267
33.	8	5 563	1 970	1 624	- 9 502
34.	8	9 321	3 914	1 493	- 17 150
35.	10	7 720	2 932	1 856	- 13 584
36.	11	9 800	6 836	39	- 23 474
37.	8	10 225	8 494	68	- 27 212
38.	12	7 317	3 235	85	- 13 788
39.	10	7 850	4 970	208	- 17 798
40.	8	7 260	3 387	487	- 14 035
41.	9	6 835	2 503	1 828	- 11 842
42.	6	5 977	1 640	2 698	- 9 256

WERTETABELLE III :

Pro SSW ermittelter Durchschnitts-
wert ($\bar{x}$) für PROLAKTIN im Serum
mit Standardabweichung (s) und dem
Vertrauensbereich des Mittelwertes
für 95 % Wahrscheinlichkeit

SSW	n	$\bar{x}$ (μ IE/ml)	($\frac{+}{-}$) s (μ IE/ml)	Vertrauensbereich	
5.	1	-	-	-	
6.	4	690	248	193	- 1 187
7.	4	645	244	157	- 1 133
8.	6	773	243	286	- 1 261
9.	6	652	280	92	- 1 213
10.	13	677	186	306	- 1 049
11.	13	661	266	130	- 1 192
12.	18	754	287	180	- 1 328
13.	13	928	299	329	- 1 526
14.	20	930	347	236	- 1 623
15.	21	1 168	423	321	- 2 015
16.	21	1 233	537	158	- 2 308
17.	19	1 662	610	443	- 2 882
18.	20	1 573	602	369	- 2 777
19.	24	2 100	700	699	- 3 501
20.	22	2 001	629	743	- 3 260
21.	20	2 200	805	590	- 3 810
22.	20	2 477	941	595	- 4 359
23.	18	2 329	933	463	- 4 195
24.	18	2 511	782	948	- 4 075
25.	21	2 594	825	944	- 4 244
26.	22	2 662	805	1 053	- 4 272
27.	23	2 965	919	1 127	- 4 803
28.	20	2 852	824	1 203	- 4 500
29.	21	2 867	757	1 353	- 4 381

SSW	n	$\bar{x}$ (μ IE/ml)	$\left(\frac{+}{-}\right) s$ (μ IE/ml)	Vertrauensbereich
30.	20	3 475	742	1 992 - 4 959
31.	23	3 344	608	2 119 - 4 550
32.	20	3 236	737	1 761 - 4 711
33.	21	3 148	886	1 377 - 4 919
34.	24	2 967	810	1 347 - 4 586
35.	24	3 037	792	1 452 - 4 621
36.	31	3 268	847	1 573 - 4 963
37.	27	3 454	752	1 951 - 4 957
38.	24	3 374	593	2 188 - 4 559
39.	26	3 320	719	1 881 - 4 758
40.	34	3 223	569	2 085 - 4 361
41.	34	3 434	555	2 324 - 4 544

WERTETABELLE I V :

HPL-Konzentrationen (μ g/ml) während der Schwangerschaft

SSW	Patientinnen (Normalkollektiv)									
	B.H.	B.T.	C.L.	H.C.	H.R.	H.W.	K.B.	K.H.	P.B.	S.E.
5.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8.	-	-	-	-	-	-	0,120	-	-	-
9.	-	0,440	-	-	-	-	0,160	-	-	-
10.	-	-	0,070	-	-	0,170	0,310	-	-	-
11.	-	-	-	0,290	-	-	0,380	-	-	-
12.	0,205	-	-	-	0,220	-	0,500	-	-	0,450
13.	-	-	1,0	0,620	-	-	0,555	-	-	-
14.	-	1,2	-	-	0,800	-	0,765	0,650	-	-
15.	1,19	-	-	1,1	-	1,1	-	-	-	0,946
16.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	-	1,3	1,2	1,3	-	-	-	1,1	-	1,2
18.	1,5	-	-	-	1,7	-	-	-	1,8	-
19.	-	1,7	1,1	1,3	-	1,4	-	-	-	1,9
20.	-	-	-	-	2,3	-	2,3	1,5	2,1	-
21.	-	1,7	-	-	-	2,0	-	-	-	2,2
22.	3,0	-	2,5	2,65	3,8	-	-	-	2,5	-
23.	-	2,4	-	-	-	2,1	-	2,2	-	3,4
24.	-	-	-	-	3,4	-	3,7	-	-	-
25.	3,8	-	2,9	-	-	2,5	-	3,5	-	4,7
26.	-	-	-	4,1	-	-	-	-	5,8	-
27.	3,8	4,0	-	-	4,3	3,6	-	5,4	-	-
28.	-	-	-	-	-	-	4,7	-	-	-
29.	6,2	-	4,0	-	-	3,7	-	-	-	5,3
30.	-	5,0	-	-	-	-	-	-	5,4	-
31.	-	-	-	-	5,5	4,0	-	-	-	6,2
32.	7,8	-	-	5,1	-	-	6,3	6,1	-	-
33.	-	5,4	-	-	-	4,7	-	-	7,2	6,0
34.	-	-	5,0	-	-	-	-	7,0	-	-
35.	-	-	-	-	5,8	5,2	-	-	7,6	6,5
36.	6,4	5,7	-	6,1	-	-	-	-	-	-
37.	-	-	-	-	4,35	-	8,3	-	-	6,0
38.	8,6	6,0	5,0	5,8	-	-	8,0	-	8,0	-
39.	-	-	-	6,2	4,10	5,6	-	7,4	-	5,85
40.	7,1	7,8	6,4	7,1	3,55	4,1	7,5	-	-	5,5
41.	-	-	-	5,7	-	4,0	-	-	-	-
42.	-	6,6	5,0	-	-	-	-	-	-	-

WERTETABELLE V:

HCG-Konzentrationen (mE/ml) während der Schwangerschaft

SSW	Patientinnen (Normalkollektiv)									
	B.H.	B.T.	C.L.	H.C.	H.R.	H.W.	K.B.	K.H.	P.B.	S.E.
5.	—	—	—	—	—	300	—	—	—	—
6.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	—	—	—	—	—	4232	—	—	—	—
8.	—	—	—	—	—	—	15686	—	—	—
9.	—	12450	—	—	—	—	27675	—	—	—
10.	—	—	56100	—	—	16605	48405	—	—	—
11.	—	—	—	36040	—	20700	40216	—	—	—
12.	37100	—	22086	—	15620	—	35175	—	—	30797
13.	—	—	—	21080	—	—	28432	—	—	—
14.	—	17890	—	—	8270	—	16313	11432	—	—
15.	10000	—	—	10270	—	5076	—	—	—	7660
16.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	—	5400	12680	8890	—	—	—	10319	—	5940
18.	10600	—	—	—	8440	—	—	—	9250	—
19.	—	5700	9890	11160	—	5150	—	—	—	6365
20.	—	—	—	—	4970	—	7727	9625	6075	—
21.	—	5595	—	—	—	5227	—	—	—	5119
22.	10050	—	5640	11100	7270	—	—	—	6390	—
23.	—	4675	—	—	—	1076	—	8770	—	5805
24.	—	—	—	—	6450	—	5931	—	—	—
25.	11300	—	5720	—	—	1667	—	9095	—	4851
26.	—	—	—	6700	—	—	—	—	3485	—
27.	7450	5595	—	—	5450	1927	—	9775	—	—
28.	—	—	—	—	—	—	7114	—	—	—
29.	11160	—	5970	—	—	4534	—	—	—	7279
30.	—	5760	—	—	—	—	—	—	7360	—
31.	—	—	—	—	6410	2076	—	—	—	8844
32.	7450	—	—	5790	—	—	6350	12130	—	—
33.	—	9030	—	—	—	4858	—	—	7000	—
34.	—	—	5095	—	—	—	—	12544	—	—
35.	—	—	—	—	7410	3657	—	—	10570	8618
36.	7630	6000	—	7200	—	—	—	—	—	—
37.	—	—	—	—	6890	—	4066	—	—	5035
38.	10750	3245	7930	4980	—	—	4878	—	6690	—
39.	—	—	—	4390	5680	—	—	7621	—	4068
40.	11580	3110	5550	5360	4400	3555	5016	—	—	4764
41.	—	—	—	6300	—	3300	—	—	—	—
42.	—	3300	4380	—	—	—	—	—	—	—

WERTETABELLE VI:

hPRL-Konzentrationen ($\mu\text{E/ml}$) während der Schwangerschaft

SSW	Patientinnen (Normalkollektiv)									
	B.H.	B.T.	C.L.	H.C.	H.R.	H.W.	K.B.	K.H.	P.B.	S.E.
5.	—	—	—	—	—	505	—	—	—	—
6.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
7.	—	—	—	—	—	860	—	—	—	—
8.	—	—	—	—	—	—	648	—	—	—
9.	—	830	—	—	—	—	539	—	—	—
10.	—	—	540	—	—	1180	684	—	—	—
11.	—	—	—	672	—	870	695	—	—	—
12.	489	—	—	—	555	—	1210	—	—	870
13.	—	—	1000	1287	—	—	825	—	—	—
14.	—	1243	—	—	675	—	1234	710	—	—
15.	1320	—	—	1111	—	1050	—	—	—	1200
16.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
17.	—	2750	1671	2058	—	—	—	780	—	1975
18.	1610	—	—	—	740	—	—	—	2460	—
19.	—	3070	2652	2196	—	1760	—	—	—	2885
20.	—	—	—	—	1210	—	2057	1780	2200	—
21.	—	3586	—	—	—	3255	—	—	—	3730
22.	3660	—	2992	4367	1320	—	—	—	2000	—
23.	—	3014	—	—	—	2470	—	2475	—	3260
24.	—	—	—	—	1224	—	1661	—	—	—
25.	2480	—	3861	—	—	3080	—	2002	—	3124
26.	—	—	—	3686	—	—	—	—	2497	—
27.	3190	3036	—	—	1738	3300	—	1870	—	—
28.	—	—	—	—	—	—	2156	—	—	—
29.	2210	—	3450	—	—	3660	—	—	—	3685
30.	—	3828	—	—	—	—	—	—	3542	—
31.	—	—	—	—	2497	3349	—	—	—	2750
32.	2570	—	—	4059	—	—	2365	2150	—	—
33.	—	3800	—	—	—	3146	—	—	3047	2596
34.	—	—	3443	—	—	—	—	2332	—	—
35.	—	—	—	—	2500	2346	—	—	4103	2827
36.	2057	3773	—	3872	—	—	—	—	—	—
37.	—	—	—	—	2948	—	2750	—	—	4125
38.	4235	3223	3674	3102	—	—	2768	—	4643	—
39.	—	—	—	3729	2695	—	—	2057	—	2948
40.	2893	3200	3810	3773	2629	3575	2810	—	—	3179
41.	—	—	—	3113	—	1986	—	—	—	—
42.	—	2830	4480	—	—	—	—	—	—	—

WERTETABELLE VIII:

HCG-Konzentrationen (mE/ml) während der Schwangerschaft

[illegible]

WERTETABELLE IX:

hPRL-Konzentrationen ($\mu\text{E/ml}$) während der Schwangerschaft[illegible]

WERTE TABELLE X: HPL-Verlauf post partum (g/ml)

[illegible]

Patientinnen (hyperprolaktinämische Amenorrhoe mit CB 154 behandelt)

[illegible]

WERTE-TABELLE XII a.: hPRL-Verlauf post partum (μ E/ml)

Patientinnen (Normalkollektiv)									
	A.H.	B.B.	B.H.	G.B.	H.C.	H.R.	H.W.	K.H.	N.A. P.B.
1 ^h ap	1793	-	-	5595	2497	4004	1668	1529	2772 4697
partus	-	4433	-	6149	-	3069	2646	-	-
10 ^h pp	3234	1866	1716	2700	3718	2266	1602	1595	1859 4048
1 ^h pp	3795	1815	2376	5285	7722	3795	2016	3564	5169 7767
4 ^h pp	-	1397	-	5571	1496	3190	2340	1309	- 3641
24 ^h pp	3928	1804	2981	3646	4037	1771	1896	3102	2827 3729
Wochenbett									
2. Tag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. Tag	2992	2240	2833	1991	2797	2079	1272	3179	2805 3542
4. Tag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5. Tag	3894	1560	1925	2480	1518	1726	1332	1848	- 1144
6. Tag	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Tag	-	-	1643	1584	1575	-	1135	2112	- 3278

WERTE-TABELLE XII b: hPRL-Verlauf post partum ($\mu\text{E/ml}$)

Patientinnen		(Hyperprolaktinämische Amenorrhoeen mit CB 154 behandelt)							
	G. I.	H. M.	K. B.	M. E.	M. I.	N. M.	P. B.	R. M.	S. E.
1 ^h ap	4813	9130	4405	2816	2841	-	16302	7350	1012
partus	-	10300	4417	3036	2468	2436	15378	-	-
10 ^h pp	5975	11420	2117	3047	2411	2640	16170	8650	-
1 ^h pp	8224	9523	5978	3400	2814	2337	14454	-	1562
4 ^h pp	5592	-	4086	3300	2088	2134	15708	-	1133
24 ^h pp	3070	9513	4361	3069	2022	1602	15750	8530	990
Wochenbett									
2. Tag	-	-	-	-	-	1747	-	-	-
3. Tag	3885	8207	3734	2860	1327	1203	13002	8750	902
4. Tag	-	-	-	-	-	1755	17490	-	-
5. Tag	-	5640	3008	2343	550	-	12740	8150	693
6. Tag	-	-	-	-	-	882	-	-	-
7. Tag	-	6804	2145	2112	-	611	15128	8480	900

8. LITERATURVERZEICHNIS

- (1) AHUMADA, J.C., Amenorrea y galactorrhea, Bol.
E.B.DEL CASTILLO: Soc. gin. y obst.
11, 64 (1932)
- (2) BELLMANN, O.: Prolactin in der Schwanger-
schaft und im Wochenbett - zur
Sekretion, Regulation und Funk-
tion
Gynäkologe 10, 66 (1977)
- (3) BESSER, G.M., Galctorrhea; successful treat-
L. PARKE, ment with reduction of plasma
C.R.W. EDWARDS, prolactin levels by bromo-ergo-
J.A. FORSYTH, cryptine
A.S. MC NEILLY: Brit. med. J. III, 669 (1972)
- (4) BESSER, G.M., Hypothalamic regulatory hor-
C.H. MORTIMER: mones; a review
J. clin. Path. 27, 173 (1974)
- (5) BISWAS, S., Plasma prolactin levels during
C.H. RODECK: pregnancy
Brit. J. Obstet. Gynaec. 83,
683 (1976)
- (6) BOHNET, H.G., Hyperprolactinemic anovula-
H.G. DAHNLEIN, tory syndrom
W. WUTTKE, J. clin. Endocr. Metab. 42,
H.P.G. SCHNEIDER: 132 (1976)
- (7) BOYAR, R.M., Hypothalamic - pituitary func-
S.M. KAPEN, tion in diverse hyperprolacti-
J.W. FINKELSTEIN, nemic states
M. PERLOW, J. clin. Invest. 53, 1588
J.F. SASSIN, (1974)
E.D. FUKUSHIMA,
L. HELLMANN:
- (8) BOYAR, R.M., Twentyfour hour prolactin
J.W. FINKELSTEIN, (PRL) secretory patterns du-
S. KAPEN, ring pregnancy
L. HELLMANN: J. clin. Endocr. 40, 1117 (1975)

- (9) BRODY, S.,
G. CARLSTRÖM: Immuno-Assay of human chorionic gonadotropin in normal and pathologic pregnancy
J. clin. Endocr. 22, 564 (1962)
- (10) BRODY, S.,
A. KLOPPER,
E. DICZFALUSY (Eds.): Foetus and Placenta
Blackwell, Oxford p. 299
(1969)
- (11) BRUN DEL RE, R.,
E. DEL POZO,
P. DE GRANDI,
H. FRIESEN,
M. HINSELMANN,
H. WYSS: Prolactin inhibition and suppression of puerperal lactation by a Br-Ergocryptine (CB 154)
A comparison with estrogen
Obstet. Gynec. 41, 884 (1973)
- (12) BUCKMAN, M. T.,
G. T. PEAKE,
G. ROBERTSON: Hyperprolactinemia influences renal function in man
Metabolism 25, 509 (1976)
- (13) CANFIELD, R. E.,
F. J. MORGAN,
S. KAMMERMAN,
J. J. BELL,
G. M. AGOSTO: Studies of human chorionic gonadotropin
Rec. Prog. Horm. Res. 27,
121 (1971)
- (14) CHIARI, J.,
C. BRAUN,
J. SPAETH: Klinik der Geburtshilfe und Gynäkologie
Erlangen: Enke (1852)
- (15) COLE, E. N.,
D. EVERED,
D. F. HORROBIN,
M. S. MANKU,
J. P. MTABAJI,
B. A. NASAR: Is prolactin a fluid and electrolyte regulating hormone in man?
J. Physiol. 252, 54 P (1975)
- (16) DEL POZO, E.,
A. DARRAGH,
J. LANCRANJAN,
D. EBELING,
P. BURMEISTER,
F. BÜHLER,
P. MARBACH,
P. BRAUN: Effect of bromocryptine on the endocrine system and fetal development
Clin. Endocr. 6, Suppl. 478
(1975)

- (17) ERDHEIM, J.,
STUMME, E.: Über die Schwangerschaftsver-
änderung der Hypophyse
Beiträge Pathol. Anatomie 46,
1 (1909)
- (18) EWERBECK, H.: Der Fetus - Pathologie in :
Gynäkologie und Geburtshilfe
Bd. II, Hrsg.: KÄSER, O.,
FRIEDBERG, V., OBER, K.G.,
THOMSEN, K., ZANDER, J.,
p. 118 Stuttgart, Thieme (1967)
- (19) FLÜCKIGER, E.,
H.R. WAGNER: 2-Brom-~~α~~-Ergokryptin: Beein-
flussung von Fertilität und Lakta-
tion bei der Ratte
Experientia 24, 1130 (1968)
- (20) FORBES, A.P.,
P.H. HENNEMANN,
G.C. GRISWOLD,
F. ALBRIGHT: Syndrome characterized by ga-
lactorrhea, amenorrhea and low
urinary FSH-comparison with
acromegaly and normal lacta-
tion
J. clin. Endocr. 14, 265 (1954)
- (21) FRANTZ, A.G.,
D.L. KLEINBERG,
G.L. NOEL: Studies on prolactin in man
Recent Prog. Horm. Research
28, 527 (1972)
- (22) FRIESEN, H.G.: Biosynthesis of placental pro-
tein and placental lactogen
Acta endocr. 83, 744 (1968)
- (23) FRIESEN, H.G.,
P. FOURNIER,
P. DESJARDINS: Pituitary prolactin in pregnancy
and normal and abnormal lac-
tation
Clin. Obstet. Gynec. 16, 25
(1973)
- (24) FRIESEN, H.G.,
G. TOLLIS: The use of bromocryptine in
the galactorrhea-amenorrhea
syndromes: the canadian coope-
rative study
Clin. Endocr. 6, Suppl. (1977)

- (25) FUCHS, F.,
G. STAKEMANN: Die Fehlgeburt in Gynäkologie und Geburtshilfe
Bd. I: Hrsg. KÄSER, O.,
FRIEDBERG, V., OBER, K. G.,
THOMSON, K., ZANDER, J.
p 73 Stuttgart: Thieme 1969
- (26) GEIGER, W.,
R. KAISER,
P. FRANCHIMONT: Comparative radioimmunolo-
gical determination of human
chorionic gonadotropin, human
placental lactogen, growth hor-
mone and thyrotropin in foetal
and maternal blood after deli-
very
Acta endocr., (Kbh.) 62, 289
(1971)
- (27) GEIGER, W.: Radioimmunological determina-
tions of STH and HCS concen-
trations in various physiologi-
cal fluids of mother and fetus
during pregnancy
Acta endocr. 68, 169 (1971)
- (28) GREENWOOD, F.C.,
W.M. HUNTER,
J.S. GLOVER: The preparation of ¹³¹J-labelled
growth hormone of high specific
radioactivity
Bioch. J. 89, 114 (1963)
- (29) HALES, C.N.,
P.J. RANDLE: Immunoassay of insulin with in-
sulin antibody precipitation
Bioch. J. 88, 137 (1963)
- (30) HERBERT, D.C.,
T. HAYASHIDA: Histologic identification and
immunochemical studies of pro-
lactin and growth hormone in
the private pituitary gland
Gen. comp. Endocr. 24, 381
(1974)
- (31) HORROBIN, D.F.,
P.G. BURSTYN,
I. J. LLOYD,
N. DURKIN,
A. LIPTON,
K.L. MUIRURI: Actions of prolactin on human
renal function
Lancet II, 352 (1971)

- (32) HORROBIN, D.F.: The possible role of prolactin in pre-eclampsia
Med. Hypotheses 1, 159 (1975)
- (33) HORROBIN, D.F.: Prolactin Annual Research Reviews
Montreal: Eden Press (1976)
- (34) HWANG, P.,
H. FRIESEN,
J. HARDY,
D. WILANSKY: Biosynthesis of human growth hormone and prolactin by normal pituitary glands and pituitary adenoma
J. clin. Endocr. Metab. 33, 1 (1971)
- (35) HWANG, P.,
H. GUYDA,
H. FRIESEN: A radioimmunoassay for human prolactin
Proc. Nat. Acad. Sci. USA 68, 1902 (1971)
- (36) ITO, Y.,
K. HIGASHI: Studies on the prolactin-like substance in human placenta
II. Endocr. Jap. 8, 279 (1961)
- (37) JAFFE, R.B.,
P.O. LEE,
A.R. MIDGLEY: Serum gonadotropin before, at the inception of and following human pregnancy
J. clin. Endocr. 29, 1281 (1969)
- (38) JAFFE, B.M.,
H.R. BEHRMANN (Eds.): Methods of Hormone Radioimmunoassay
Academic Press, New York/London (1974)
- (39) JOSIMOVICH, J.B.,
J.A. MC LAREN: Presence in the human placenta and term serum of a highly lactogenic substance immunologically related to the pituitary growth hormone
Acta endocr. 71, 209 (1962)
- (40) LETCHWORTH, A.T.,
R. BOARDMAN,
C. BRISTOW,
J. LANDOM,
T. CHARD: A rapid radioimmunoassay for human chorionic somatomammotropin
J. Obstet. Gynaec. Br. Commonw. 78, 535 (1971)

- (41) LETCHWORTH, A.T.,
T. CHARD;

Placental lactogen levels as a screening test for fetal distress an neonatal asphyxia
Lance 1, 704 (1972)
- (42) LEWIS, U.J.,
R.N.P. SINGH,
B.K. SEAVEY;

Problems in the purification of human prolactin
In Prolactin and carcinogenesis: proceedings of the Fourth Teno-
vus Workshop, Cardiff, March 1972,
edited by A.R.Boyns, K. Griffiths,
p. 4, Cardiff: Alpha Omega Alpha
1972
- (43) L'HERMITE, M.,
B. STAVRIC,
C. ROBYN;

Human pituitary prolactin during pregnancy and post partum as measurd in serum by a radioimmunoassay
Acta endocr. (Kbh.) Suppl. 159,
37 (1972)
- (44) LI, C.H.:

Recent knowledge of the chemistry of lactogenic hormones
in: Wolstenholme-Knight: Lactogenic Hormones
Ch. Livingstone, Edinburgh-London (1972)
- (45) MISHELL, D.R.jur.,
L. WIDE,
C.A. GEMZELL;

Immunologic determination of human chorionic gonadotropin in serum
J. clin. Endocr. 23, 125 (1963)
- (46) MORGAN, C.R.,
A. LAZAROW,
PH. D. MINNEAPOLIS:

Immunoassay of insulin: Two antibody system. Plasma insulin levels of normal, subdiabetic and diabetic rats
Diabetes 12, 115 (1963)
- (47) NIALL, H.,
G. TREGGEAR:

The chemistry of human lactogenic hormones
in: Prolactin and carcinogenesis
Eds. A.R. BOYNS, K. GRIFFITHS
Alpha Omega Publishing, Cardiff
1972

- (48) NOLL, G.L.,
H.K. SUH,
J.G. STONE,
A.G. FRANTZ: Human prolactin and growth hormone release during surgery and other conditions of stress
J. Clin. Endocr. 35, 840 (1972)
- (49) PAVLOU, C.,
T. CHARD,
A.T. LETCHWORTH: Circulating levels of the human chorionic somatomammotrophin in late pregnancy; Disappearance from the circulation after delivery, variation during labour, and circadian variation.
J. Obstet. Gynec. Brit. Cwlth. 79, 629 (1972)
- (50) PORTER, J.C.: Hormonal regulation of breast development and activity
J. invest. Dermat. 63, 85 (1974)
- (51) PRANG, R.A.: Radioimmunologische Bestimmung von HCG und HPL in Serum und Urin während der Schwangerschaft und post partum unter besonderer Berücksichtigung der renalen Hormon-Clearance
Doktorarbeit/ I. Univ.-Frauenklinik München (1973)
- (52) RJOSK, H.K.,
K. VON WERDER,
R. FAHLBUSCH: Hyperprolactinämische Amenorrhoe
Geburtsh. Frauenheilk. 36, 575 (1976)
- (53) ROMEIS, B.: Die Hypophyse -
Handbuch der mikrosk. Anatomie VI/3, 203
Springer 1940
- (54) SAXENA, B.N.,
S. REFETOFF,
K. EMERSON JR.,
H.A. SELENKOW: A rapid radioimmunoassay for human placental lactogen. Application to normal and pathologic pregnancies
Amer. J. Obstet. Gynec. 101, 874, (1968)
- (55) SAXENA, B.N.: Protein-Polypeptide hormones of the human placenta
Vitamines and Hormones 29, 96 (1971)

- (56) SCHENKER, J.G., M. BEN-DAVID, W.Z. POLISHUK: Prolactin in normal pregnancy: relationship of maternal, fetal, and amniotic fluid levels
Amer. J. Obstet. Gyn. 123, 834 (1975)
- (57) SCHMIDT-GOLLWITZER, M., B.B. SAXENA: Radioimmunoassay of human prolactin (hPRL)
Acta endocr. (Kbh.) 80, 834 (1975)
- (58) SPELLACY, W.N., W.P. COHEN, K.L. CARLSON: Human placental lactogen levels as a measure of placental function
Amer. U. Obst. Gyn. 97, 560 (1967)
- (59) SPELLACY, W.N., W.C. BUHL, S.A. BIRK: Human growth hormone and placental lactogen levels in mid-pregnancy and late post partum
Obstet. and Gynec. 36, 238 (1970)
- (60) SPELLACY, W.N., W.C. BUHL, J.D. SCHRAM, S.A. BIRK, S.A. Mc CREARY: Control of human chorionic somatomammotropin levels during pregnancy
J. Obstet. Gynec. 37, 567 (1971)
- (61) THORNER, M.O., G.M. BESSER, A. JONES, J. DACIE, A.E. JONES: Bromocryptine treatment of female infertility: report of 13 pregnancies
Brit. med. J. IV, 694 (1975)
- (62) TURKINGTON, R.W., W.L. FRANTZ, G.C. MAJUNDER: Effector-receptor relations in the action of prolactin in Human Prolactin, edited by J.L. PASTEELS, D. ROBYN, p. 24, Amsterdam: Excerpta Medica 1973
- (63) TYSON, J.E., P. HWANG, H. GUYDA, H. FRIESEN: Studies of prolactin secretion in human pregnancy
Amer. J. Obst. Gyn. 113, 14 (1972)

- (64) TYSON, J.E.,
M. KHOJANDER,
J. HUTH,
B. ANDREASSEN: The influence of prolactin secretion on human lactation
J. clin. Endocr. 40, 764 (1975a)
- (65) VAITUKAITIS, J.L.: Endocrinology of Pregnancy second edition
FUCHS, KLOPPERS (Eds.)
Hagerstown: Harper & Row
p 63 (1977)
- (66) WERDER, K. VON: Wachstumshormone und Prolactinsekretion des Menschen
Urban & Schwarzenberg
manuscript S. 32 (1975)
- (67) WERDER, K. VON,
R. FAHLBUSCH,
R. LANDGRAF,
C.R. DICKARDT,
H.K. RJOSK,
P.C. SCRIBA: Medical therapy of hyperprolactinemia associated with pituitary tumors. In: R. FAHLBUSCH und K. VON WERDER (Hrsg.): Proceedings of the European Workshop on Treatment of Pituitary Adenomas
Stuttgart: Thieme (1977)
- (68) YALOW, R.S.,
S.A. BERSON: Immunoassay of endogenous plasma insulin in man
J. clin. Invest. 39, 1157 (1960)

Die vorliegende Arbeit wurde unter der Leitung von Herrn Dr. H. -K. Rjosk im Proteo-Hormonlabor der I. Universitäts-Frauenklinik (Leiter Prof. Dr. J. Zander) in der Zeit von Mai 1975 bis März 1977 durchgeführt.

Herrn Prof. Dr. J. Zander bin ich für die Überlassung des Arbeitsplatzes in der Klinik zu Dank verpflichtet.

Herrn Prof. Dr. K. Holzmann danke ich für sein wohlwollendes Interesse an der Arbeit und die Übernahme des Referates.

Für die Überlassung des Themas sowie für wertvolle Ratschläge und kritische Diskussionen danke ich insbesondere Herrn Dr. H. -K. Rjosk.

Frau E. Hoffmann sage ich Dank für Ihre stets freundliche und intensive Einführung in die nuklearmedizinische Arbeitsmethodik.

Außerdem gilt mein Dank der Fotografin Frau B. Mair-Wellner für die engagierte graphische Mitgestaltung der Arbeit.

Lebenslauf

Am 21. September 1948 wurde ich als einziges Kind des Metzgers Johann Huber und seiner Ehefrau Dorothea, geb. Leiteritz, in München geboren.

Nach dem Besuch der Volksschule von 1954 bis 1960 und dreijährigem Aufbauzug begann ich eine Lehre als Chemielaborant am Anorgan. Institut der Universität München, die im Februar 1967 mit der Industrie- und Handelskammerprüfung endete.

Von 1966 bis 1970 besuchte ich das Abendgymnasium für Berufstätige der Stadt München, wo ich im Juni 1970 das Abitur am mathematisch-naturwissenschaftlichen Zweig ablegte.

Ab Juli 1970 bis Dezember 1971 leistete ich meinen Grundwehrdienst.

Im Wintersemester 1971 begann ich das Chemiestudium an der Universität München und wechselte im Sommersemester 1972 auf das Fach Humanmedizin. Ab September 1973 erhielt ich ein Stipendium der Friedrich-Ebert-Stiftung in Bonn. Nach zwei Semestern folgte das Vorphysikum (BOÄ), nach weiteren drei das Physikum (BOÄ). Die klinischen Semester sowie das Praktische Jahr absolvierte ich nach der neuen Studienordnung (ÄAppO). Im Mai 1978 bestand ich in München mit dem III. Abschnitt der Ärztlichen Prüfung das medizinische Staatsexamen.

München, im November 1978

